

INFORMACION GENERAL

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre producto: Bovilis L5 SQ | Composición: Cada dosis de 2 mL contiene <i>L. Canicola</i> : RP ≥1.2, <i>L. Hardjo</i> : RP ≥1.1, <i>L. Pomona</i> : RP ≥1.0, <i>L. Grippotyphosa</i> : RP ≥1.2, <i>L. Icterohaemorrhagiae</i> : RP ≥1.3. RP = Potencia relativa |
| Forma farmacéutica: Suspensión | |

DATOS CLÍNICOS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especies: Bovinos  | Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso veterinario . Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Usar sólo en ganado sano. Si ocurre una reacción alérgica, tratar con epinefrina. Almacenar refrigerado entre 2 y 7°C. No congelar. Utilizar inmediatamente después de abierto. |
| Indicaciones: Para la vacunación de ganado sano de 6 meses de edad y mayores como una ayuda en la prevención de la leptospirosis (causada por <i>Leptospira interrogans</i> serovares <i>canicola</i> , <i>grippotyphosa</i> , <i>icterohaemorrhagiae</i> , <i>pomona</i> y <i>Leptospira borgpetersenni</i> serovar <i>hardjo bovis</i>) y como ayuda en la prevención de la eliminación urinaria de organismos <i>L hardjo</i> . | Dosis/Vía de administración: Inyectar 2 mL por vía subcutánea a ganado sano de 6 meses de edad y mayor. Se recomienda revacunación anual. |
| | Tiempo de retiro: No aplica. |

INFORMACION FARMACEUTICA

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lista de excipientes: EMA/DDA, Timerosal, solución salina o PBS | Almacenamiento: Almacenar refrigerado entre 2 y 7°C |
| Vida útil: 24 Meses | Presentación: Fascos de polietileno por 10, 20, 100 y 200 mL con 5, 10, 50 y 100 Dosis respectivamente. |

TITULARIDAD

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050 | Titular/Fabricante: Intervet Inc – Estados Unidos | |
| | Número Reg. ICA: 9009-BV | Fecha emisión: 26-Jun-2012 |

