


**INFORMACION GENERAL**

<p><b>Nombre producto:</b>                  Bovilis Vista 5 L5 SQ</p>	<p><b>Composición:</b></p> <p>Cada dosis de 2 ml contiene:</p> <p>Virus de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) 10<sup>3.6</sup> TCID<sub>50</sub>                  Virus de la Diarrea Viral Bovina (DVB) Tipo 1 10<sup>3.8</sup> TCID<sub>50</sub>                  Virus de la Diarrea Viral Bovina (DVB) Tipo 2 10<sup>3.5</sup> TCID<sub>50</sub>                  Virus de la Parainfluenza (PI3) Tipo 3 10<sup>5.1</sup> TCID<sub>50</sub>                  Virus Respiratorio Sincitial Bovino (BRSV) 10<sup>3.8</sup> TCID<sub>50</sub>  <i>Leptospira canicola</i> RP 1,2  <i>Leptospira grippotyphosa</i> RP 1,2  <i>Leptospira hardjo</i> RP 1,1  <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> RP 1,3  <i>Leptospira pomona</i> RP 1,0                  (RP = Potencia Relativa)</p>
<p><b>Forma farmacéutica:</b>                  Suspensión</p>	

**DATOS CLÍNICOS**

<p><b>Especies:</b>                  Bovinos</p> 	<p><b>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:</b></p> <p>Uso veterinario . Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Almacenar en refrigeración ( 2 y 7 °C). No congelar. Utilizar inmediatamente después de reconstituída. Si se presentan reacciones alérgicas, administre epinefrina. Contiene penicilina, estreptomycin y timerosal como conservadores.</p>
<p><b>Indicaciones:</b></p> <p>Para la vacunación de vacas y terneras sanas de seis meses de edad o mayores antes de la monta, como ayuda en la reducción de abortos debidos a IBR, en la prevención de la infección fetal, incluyendo la presencia de becerros persistentemente infectados a causa del virus de la DVB tipo 1 y tipo 2, y en la prevención de las enfermedades causadas por IBR, DVB (Tipo 2) y BRSV. Como ayuda en el control de las enfermedades causadas por DVB (tipo1) y PI3. Como ayuda en la prevención de la leptospirosis causada por <i>Leptospira interrogans</i> serovares <i>canicola</i>, <i>grippotyphosa</i>, <i>hardjo</i>, <i>icterohaemorrhagiae</i> y <i>pomona</i>.</p>	<p><b>Dosis/Vía de administración:</b></p> <p>Inyectar 2.0 mL por vía subcutánea 14-60 días antes de la monta y a bovinos sanos de 6 meses de edad o mayores. Se recomienda la revacunación anual. Para la revacunación se puede administrar una dosis a intervalos más frecuentes basados en la evaluación del riesgo u otras condiciones de epidemia que existan o sean reportadas en cada explotación. Consulte al Médico Veterinario.</p> <p><b>Tiempo de retiro:</b>                  No aplica.</p>



**BOVILIS VISTA 5 L5 SQ**  
PRODUCTO BIOLÓGICO

**INFORMACION FARMACEUTICA**

<b>Lista de excipientes:</b> Suero equino, pluronic F68, medio DMEM, estabilizador, EMA/DDA, Timerosal 10%, PBS o solución salina estéril.	<b>Almacenamiento:</b> Almacenar refrigerado entre 2 y 8°C
<b>Vida útil:</b> 24 Meses	<b>Presentación:</b> Frascos de vidrio tipo I por 5, 10, 50 y 100 dosis.

**TITULARIDAD**

<b>Información de contacto/Importador:</b> MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	<b>Titular/Fabricante:</b> Intervet Inc. – Estados Unidos
	<b>Número Reg. ICA:</b> 9208-BV

