


INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Bravecto Spot On	Composición: Cada mL de solución tópica (Spot On) contiene:
Forma farmacéutica: Solución tópica (Spot On)	Fluralaner: 280 mg

DATOS CLÍNICOS

<p>Especies: Caninos, Felinos</p> 	<p>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso veterinario. Consulte al médico veterinario. Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos. Para uso tópico. Causa irritación moderada en los ojos. No utilice directamente sobre lesiones de piel. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo. Las pipetas deben conservarse dentro del sobre de plástico para evitar la pérdida del solvente o la absorción de humedad. Los empaques deben abrirse justo antes de ser utilizados. No almacenar a más de 30°C. El producto es altamente inflamable. GATOS: No debe utilizarse en gatitos menores de 9 semanas de edad y/o gatos que pesen menos de 1,2 kg. PERROS: No debe utilizarse en cachorros de menos de 8 semanas de edad y/o perros que pesen menos de 2 kg. Muy raramente se han notificado emesis, letargo e inapetencia en informes espontáneos después del uso de este producto.</p>																				
<p>Indicaciones: Gatos: Para el tratamiento de infestaciones por garrapatas (<i>Ixodes ricinus</i>, <i>Rhipicephalus sanguineus</i>, <i>Dermacentor reticulatus</i>, <i>Ixodes scapularis</i>, <i>I. hexagonus</i>) y pulgas (<i>Ctenocephalides felis</i>) en gatos. Para el tratamiento de infestaciones con ácaros de los oídos (<i>Otodectes cynotis</i>). Perros: Para el tratamiento de infestaciones por garrapatas (<i>Ixodes ricinus</i>, <i>Rhipicephalus sanguineus</i>, <i>Dermacentor reticulatus</i>, <i>Ixodes scapularis</i>, <i>I. hexagonus</i> y <i>Haemaphysalis elliptica</i>) y pulgas (<i>Ctenocephalides felis</i> y <i>C. canis</i>) en perros. Un tratamiento previene por 12 semanas la transmisión de <i>Dipylidium caninum</i> de pulgas infectadas a perros susceptibles. Para el tratamiento de demodicosis causada por ácaros (<i>Demodex spp.</i>), infestaciones con ácaros de los oídos (<i>Otodectes cynotis</i>) e infestaciones con sarna sarcóptica (<i>Sarcoptes scabiei</i>).</p>	<p>Dosis/Vía de administración: Uso tópico</p> <p>Gatos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Peso del gato (kg)</th> <th>Pipetas a utilizarse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,2-2,8</td> <td>1 de 112,5 mg</td> </tr> <tr> <td>> 2,8 – 6,25</td> <td>1 de 250 mg</td> </tr> <tr> <td>> 6,25 - 12,5</td> <td>1 de 500 mg</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para gatos de más de 12,5 kg, use una combinación de dos pipetas que se ajuste al peso del animal.</p> <p>Perros:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Peso del perro (kg)</th> <th>Pipetas a utilizarse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 - 4,5</td> <td>1 de 112,5 mg</td> </tr> <tr> <td>> 4,5 – 10</td> <td>1 de 250 mg</td> </tr> <tr> <td>> 10 – 20</td> <td>1 de 500 mg</td> </tr> <tr> <td>> 20 – 40</td> <td>1 de 1000 mg</td> </tr> <tr> <td>> 40 -56</td> <td>1 de 1400 mg</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para perros de más de 56 kg, use una combinación de dos pipetas que se ajuste al peso del animal.</p> <p>Administrar cada 12 semanas.</p>	Peso del gato (kg)	Pipetas a utilizarse	1,2-2,8	1 de 112,5 mg	> 2,8 – 6,25	1 de 250 mg	> 6,25 - 12,5	1 de 500 mg	Peso del perro (kg)	Pipetas a utilizarse	2 - 4,5	1 de 112,5 mg	> 4,5 – 10	1 de 250 mg	> 10 – 20	1 de 500 mg	> 20 – 40	1 de 1000 mg	> 40 -56	1 de 1400 mg
Peso del gato (kg)	Pipetas a utilizarse																				
1,2-2,8	1 de 112,5 mg																				
> 2,8 – 6,25	1 de 250 mg																				
> 6,25 - 12,5	1 de 500 mg																				
Peso del perro (kg)	Pipetas a utilizarse																				
2 - 4,5	1 de 112,5 mg																				
> 4,5 – 10	1 de 250 mg																				
> 10 – 20	1 de 500 mg																				
> 20 – 40	1 de 1000 mg																				
> 40 -56	1 de 1400 mg																				
	<p>Tiempo de retiro: No aplica.</p>																				



INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: Dimetilacetamida, Glicofuroil, dietiltoluamida, acetona	Almacenamiento: Conservar a temperatura no mayor a 30°C.
Vida útil: 24 Meses	Presentación: Pipeta de una dosis con una lámina de aluminio/polipropileno, sellada con una tapa de PEAD y empacada en sobre laminado de aluminio. Cada caja de cartón contiene 1 o 2 pipetas para gatos de 0,4; 0,89; 7 1,79 mL. Pipeta de una dosis con una lámina de aluminio/polipropileno, sellada con una tapa de PEAD y empacada en sobre laminado de aluminio. Cada caja de cartón contiene 1 o 2 pipetas para perros de 0,4; 0,89; 1,79; 3,57; y 5,0 mL

TITULARIDAD

Información de contacto: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Fabricante/Titular: Intervet Inc. (Estados Unidos)	
	Número Reg. ICA: 10422-MV	Fecha emisión: 23-Ago-2019

