

**INFORMACION GENERAL**

<b>Nombre producto:</b> Caninsulín	<b>Composición:</b> Cada mL contiene:
<b>Forma farmacéutica:</b> Suspensión inyectable	Insulina porcina 40 UI

**DATOS CLÍNICOS**

<p><b>Especies:</b> Caninos, Felinos</p> 	<p><b>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:</b></p> <p>Uso veterinario, Manténgase fuera del alcance de los niños. Conservar entre 2°C y 8°C. No congelar. Proteger de la luz. Almacenar en posición vertical. Luego del retiro de la primera dosis utilizar el producto antes de 42 días. Si se observa algún crecimiento o cambio de color, el producto debe ser eliminado.</p>																
<p><b>Indicaciones:</b></p> <p>Insulina de acción intermedia para el tratamiento de la diabetes mellitus en perros y gatos.</p>	<p><b>Dosis/Vía de administración:</b></p> <p>Aplicación subcutánea.</p> <p>Agitar vigorosamente hasta lograr una apariencia homogénea lechosa. Dejar dispersar la espuma formada antes de usar. No usar el producto si persisten grumos después de agitar. Caninsulín debe administrarse mediante inyección subcutánea, utilizando un dispositivo calibrado para una preparación de 40 UI/mL.</p> <p><u>En perros</u>, caninsulin debe ser administrado una vez al día. La dosis inicial es de 0.5 UI por kg de acuerdo a la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Peso corporal</th> <th>Dosis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 kg</td> <td>2 UI una vez al día</td> </tr> <tr> <td>10 kg</td> <td>5 UI una vez al día</td> </tr> <tr> <td>15 kg</td> <td>7 UI una vez al día</td> </tr> <tr> <td>20 kg</td> <td>10 UI una vez al día</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>En gatos</u>, debe administrarse dos veces al día a intervalos de 12 horas. La dosis se determina de acuerdo a las mediciones de glicemia:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concentración sérica de glucosa</th> <th>Dosis inicial por gato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt;20 mmol/l o &lt;3,6/l (360 mg/dl)</td> <td>1 UI 2 veces al día</td> </tr> <tr> <td>≥20 mmol/l o ≥3,6 g/l (360 mg/dl)</td> <td>2 UI 2 veces al día</td> </tr> </tbody> </table>	Peso corporal	Dosis	5 kg	2 UI una vez al día	10 kg	5 UI una vez al día	15 kg	7 UI una vez al día	20 kg	10 UI una vez al día	Concentración sérica de glucosa	Dosis inicial por gato	<20 mmol/l o <3,6/l (360 mg/dl)	1 UI 2 veces al día	≥20 mmol/l o ≥3,6 g/l (360 mg/dl)	2 UI 2 veces al día
Peso corporal	Dosis																
5 kg	2 UI una vez al día																
10 kg	5 UI una vez al día																
15 kg	7 UI una vez al día																
20 kg	10 UI una vez al día																
Concentración sérica de glucosa	Dosis inicial por gato																
<20 mmol/l o <3,6/l (360 mg/dl)	1 UI 2 veces al día																
≥20 mmol/l o ≥3,6 g/l (360 mg/dl)	2 UI 2 veces al día																
	<p><b>Tiempo de retiro:</b> No aplica.</p>																



### INFORMACION FARMACEUTICA

**Lista de excipientes:**

Zinc, metilparahidroxibenzoato, acetato de sodio trihidratado, cloruro de sodio, ácido clorhídrico y/o hidróxido de sodio y agua destilada para inyección.

**Almacenamiento:**

Conservar entre 2°C y 8°C. Después de abierto, mantener en refrigeración. No congelar. Almacenar en posición vertical.

**Vida útil:**

24 Meses

**Presentación:**

Viales de vidrio tipo I por 2,5 y 10 mL. Cartucho de vidrio tipo I por 2,7 mL.

### TITULARIDAD

**Información de contacto:**

**MSD Salud Animal Colombia S.A.S.**  
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,  
Colombia  
Teléfono: 571 592 5050

**Fabricante/Titular:**

Intervet Internacional GmbH. - Alemania

**Número Reg. ICA:**  
8699-MV

**Fecha emisión:**  
17-Ago-2011

