


**INFORMACION GENERAL**

<b>Nombre producto:</b> Cobactan LC	<b>Composición:</b> Cada jeringa por 8 g contiene:
<b>Forma farmacéutica:</b> Suspensión	Cefquinoma sulfato 75 mg

**DATOS CLÍNICOS**

<b>Especies:</b> Bovinos 	<b>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:</b> Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Almacenar a temperatura inferior a 25 °C y protegido de la luz. Uso veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños.
<b>Indicaciones:</b> En vacas lactantes para el tratamiento de la mastitis clínica causada por <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus uberis</i> , <i>Streptococcus dysgalactiae</i> y <i>Escherichia coli</i> .	<b>Dosis/Vía de administración:</b> Aplicar el contenido de una jeringa en el canal del pezón de cada cuarto infectado, cada 12 horas hasta completar 3 aplicaciones. Vaciar muy bien el cuarto infectado. Lavar y desinfectar muy bien el cuarto y el pezón. Introduzca suavemente el contenido del tubo en el cuarto infectado. Haga un masaje suave del pezón y la ubre para favorecer la dispersión del producto.
	<b>Tiempo de retiro:</b> Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 2 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado el mismo, no debe destinarse para el consumo humano.

**INFORMACION FARMACEUTICA**

<b>Lista de excipientes:</b> Parafina blanca, parafina líquida.	<b>Almacenamiento:</b> Almacenar por debajo de 25°C.
<b>Vida útil:</b> 30 Meses	<b>Presentación:</b> Jeringa en polietileno de alta densidad por 8 g. Caja por 3 jeringas.

**TITULARIDAD**

<b>Información de contacto/Importador:</b> MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	<b>Titular:</b> Intervet International BV – Holanda	<b>Fabricante:</b> Intervet International GmbH - Alemania
	<b>Número Reg. ICA:</b> 4950-DB	<b>Fecha emisión:</b> 09-Oct-2000

