

**INFORMACION GENERAL**

**Nombre producto:**  
Conceptal

**Composición:**

Cada ml de solución inyectable contiene:


**Forma farmacéutica:**  
Solución inyectable

Acetato de Buserelina (Equivalente a 0,004 mg de buserelina) 0,0042 mg

**DATOS CLÍNICOS**

**Especies:**

Bovinos, equinos, conejas.



**Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:**

No almacenar a temperaturas mayores a 25°C. Después de abierto, puede almacenarse 2-8 °C hasta 24 horas. Uso veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

**Indicaciones:**

En vacas, yeguas y conejas para la inducción de la ovulación e incremento de los índices de concepción. En vacas y yeguas, para el tratamiento de trastornos de la fecundidad de origen ovárico. En vacas para mejorar la tasa de preñez entre el día 10 y 12 después de la inseminación, al ayudar a evitar la lúteolisis y la mortalidad embrionaria consecuyente.

**Dosis/Vía de administración:**

Vaca:

Trastorno de la fertilidad de origen ovárico, particularmente:

- Quistes foliculares con o sin síntomas de ninfomanía 5 mL.
- Aciclia y anestro 5 mL.
- Ovulación retardada 2.5 mL.
- Atresia folicular 2.5 mL.

Incremento del índice de concepción en la inseminación artificial, y también tras la sincronización del celo 2.5 mL.

Profilaxis de los trastornos de la fecundidad por inducción prematura del ciclo posparto 5 mL. Para reducir la mortalidad embrionaria y mejorar la fase de la preñez 2.5 mL 10-12 días post-inseminación.

Yegua:

Trastornos quísticos de los ovarios acompañados o no de celo prolongado o permanente 10 mL.

Aciclia 2 veces 5 mL a intervalo de 24 horas.

Inducción de la ovulación 10 mL.

Para fijar mejor el tiempo de la ovulación y la monta 10 mL.

Para mejorar el índice de concepción 10 mL.

En celo prolongado o permanente 10 mL.

Coneja:

Para mejorar el índice de concepción 0.2 mL.

Inducción de la ovulación en la inseminación posparto 0.2 mL.

Conceptal se inyectará preferentemente por vía intramuscular. También podrá administrarse por vía intravenosa o subcutánea

**Tiempo de retiro:**

Ninguno.



**INFORMACION FARMACEUTICA**

**Lista de excipientes:**

Alcohol bencílico, cloruro de sodio, sodio hidrógeno fosfato 1-hidrato, hidróxido de sodio, agua para inyección.

**Almacenamiento:**

Almacenar por debajo de 25°C.

**Vida útil:**

18 Meses

**Presentación:**

Frascos de vidrio tipo I por 10 mL.

**TITULARIDAD**

**Información de contacto/Importador:**

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,  
Colombia  
Teléfono: 571 592 5050

**Titular/Fabricante:**

Intervet International GmbH - Alemania

**Número Reg. ICA:**

1659-DB

**Fecha emisión:**

27-Jun-1996

