

INFORMACION GENERAL

Nombre producto:
Covexin 10

Forma farmacéutica:
Suspensión

Composición:

Cada mL de bacterina - Toxoide en Hidróxido de aluminio contiene :
Clostridium perfringens tipo A (Toxoide) mínimo 0,5 IU ,
Clostridium perfringens Tipo B (Toxoide) mínimo 10 IU, mínimo 5 IU,
Clostridium perfringens Tipo C (Toxoide) mínimo 10 IU ,
Clostridium perfringens tipo D (Toxoide) mínimo 5 IU ,
Clostridium chauvoei (Cultivo total) mínimo 90% de protección,
Clostridium novyi (toxoides) mínimo 3.5 IU ,
Clostridium septicum (Toxoide) mínimo 2.5 IU,
Clostridium tetani (Toxoide) mínimo 2.5 Lf IU,
Clostridium sordelli (Toxoide) mínimo 10 Unidades,
Clostridium haemolyticum (Hemolisina) mínimo 10 unidades.

DATOS CLÍNICOS

Especies:
Bovinos, ovinos.



Indicaciones:

Para la inmunización activa de ovinos y bovinos desde las dos semanas de edad, para prevenir mortalidad, lesiones y signos clínicos de enfermedad causada por *Clostridium perfringens* tipo A (enterotoxemia, gangrena gaseosa), *C. perfringens* tipo B (disentería ovina, enterotoxemia), *C. perfringens* tipo C (enterotoxemia), *C. perfringens* tipo D (enterotoxemia, riñón pulposo), *C. chauvoei* (carbón sintomático, pierna negra, gangrena post parto), *C. novyi* tipo B (enfermedad negra, hepatitis necrótica infecciosa), *C. septicum* (edema maligno), *C. tetani* (tétano), *C. sordelli* (síndrome de la muerte súbita) y hemolisina de *C. haemolyticum* (enfermedad de orina roja). Una protección completa se desarrolla a los 14 días de la administración de la segunda dosis y la duración de la inmunidad es de al menos 12 meses desde la vacunación inicial.

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:

No vacunar ovinos o bovinos enfermos o animales que tengan enfermedad subclínica o estrés fisiológico. Se recomienda no usar otras vacunas 14 días antes o después de la vacunación con este producto. Como ocurre con cualquier vacuna, pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad. En tales casos se debe utilizar adrenalina o antihistamínico de inmediato. Uso veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar entre 2 y 8 °C. Frascos abiertos se deben desechar máximo 8 horas después de abiertos. Agitar muy bien antes de su uso. Venta bajo fórmula del médico veterinario. No congelar.

Dosis/Vía de administración:

Vacas y terneros mayores de dos semanas de edad: Aplicar una dosis de 2 mL y revacunar a las 6 semanas. Revacunar anualmente. Vacas previamente vacunadas deben ser inyectadas 2 a 6 semanas antes del parto. Esto proporciona protección pasiva al ternero por el calostro, hasta por 12 semanas.
Ovejas y corderos mayores de 2 meses: Aplicar una dosis de 1 mL y revacunar a las 6 semanas. Revacunar anualmente. Ovejas previamente vacunadas deben ser inyectadas 2 a 6 semanas antes del parto. Esto proporciona protección pasiva al cordero por el calostro, hasta por 12 semanas. La vacuna se puede usar en corderos de 2 semanas de edad sin tener en cuenta los niveles de antitoxina adquiridos desde la madre.

Inyección subcutánea, preferiblemente en la piel lateral del cuello, con la debida asepsia. El recipiente se debe agitar antes de retirar la dosis.

Tiempo de retiro:
Ninguno.



INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: Preservante: Timerosal	Almacenamiento: Almacenar entre 2°C y 8°C.
Vida útil: 30 Meses	Presentación: Frasco por 20, 50, 100, 250 mL correspondientes a 10, 25, 50 y 125 dosis bovina.

TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Titular/Fabricante: Schering Plough Animal Health Limited. – Nueva Zelanda	
	Número Reg. ICA: 6378-BV	Fecha emisión: 07-Ene-2004

