

INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Equillis Prequenza Te	Composición: Cada dosis de 1 mL de toxoide contiene:
Forma farmacéutica: Suspensión inyectable	A/equino-2/Newmarket/2/93 50 AU* A/equino-2/Sur africa/4/03. 50 AU Toxoide tetánico 40 Lf** *50 AU: Unidades antigénicas **Lf: equivalentes de floculación (corresponde con ≥ 30 UI/mL).

DATOS CLÍNICOS

Especies: Equinos 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No congelar.
Indicaciones: Para la inmunización activa de los caballos contra la influenza equina, para reducir la gravedad y duración de los síntomas clínicos y la excreción de cirus tras la infección y para la inmunización activa contra el tétanos equino. Influeza Aparición de la inmunidad: 2 semanas después de la vacunación primaria Duración de la inmunidad: 5 meses después de la vacunación primaria. 12 meses después de la revacunación. Tétanos: Aparición de la inmunidad: 2 semanas después de la vacunación primaria Duración de la inmunidad: 17 meses después de la vacunación primaria. 24 meses después de la revacunación.	Dosis/Vía de administración: Inyección intramuscular de una dosis (1 mL) por animal. Antes de aplicar permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente 15-25°C máximo dos horas antes de su uso. <u>Influenza:</u> <u>Programa de vacunación primario:</u> A todo caballo que no haya sido vacunado previamente se le deberán administrar dos vacunaciones de una dosis con un intervalo de 4 semanas entre sí. El programa de vacunación primaria da lugar a inmunidad frente a la influenza equina que se mantiene durante al menos 5 meses. Los potros deben ser vacunados de los 6 meses de edad en adelante. Si se vacuna el animal antes de los 6 meses de edad, habrá protección completa a partir de la tercera dosis (primera revacunación). <u>Revacunación:</u> La primera revacunación (tercera dosis) se administra 5 meses después del programa de vacunación básica. Esta revacunación con Equillis Prequenza Te o Equillis Prequenza da lugar a inmunidad frente a la influenza equina que se mantiene durante al menos 12 meses. La segunda revacunación se administra 12 meses después de la primera revacunación. Para mantener los niveles de inmunidad para el componente influenza se recomienda el uso alterno, a intervalo de 12 meses, de una vacuna adecuada frente a la influenza equina que contenga las cepas A/equi 1/Praga 56, A7Equi 2/Newmarket 1/93 y A/equi 2/Newmarket 2/93. <u>Tétanos:</u> <u>Programa de vacunación primario:</u> A todo caballo que no haya sido vacunado previamente se le deberán administrar dos vacunaciones de una dosis con un intervalo de 4 semanas entre sí. El programa de vacunación primaria da lugar a inmunidad frente al tétanos durante al menos 17 meses. <u>Revacunación:</u> La primera revacunación frente al tétanos se puede administrar 17 meses después del programa de vacunación básica. O, si se administra una tercera dosis de vacuna de tétanos de Intervet a los 5 meses del programa de vacunación primaria, la siguiente vacuna frente al tétanos se puede administrar después de 24 meses. <u>Vacuna de emergencia:</u> La vacuna puede ser utilizada conjuntamente con suero tetánico de Intervet para el tratamiento de caballos lesionados que no hayan sido inmunizados frente al tétanos. En ese caso, la primera dosis del programa de vacunación primario puede ser administrada conjuntamente con la dosis profiláctica adecuada de Suero Tetánico de Intervet en un lugar de inyección separado. La segunda dosis se puede administrar 4 semanas después, tal y como se ha explicado arriba. Se recomienda repetir la inmunización frente al tétanos después de 1 mes aproximadamente. Tiempo de retiro: Cero días.



INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: Soporte de liofilización (matriz C), tampón PBS	Almacenamiento: Almacenar entre 2 – 8°C.
Vida útil: 36 Meses	Presentación: Jeringa pre-llenada en vidrio tipo I unidosis, viales en vidrio tipo I unidosis. Caja de cartón por 10, 5 o 1 jeringa. Caja de cartón por 10 viales.

TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Titular/Fabricante Intervet International B.V. - Holanda	
	Número Reg. ICA: 9636 - BV	Fecha emisión: 13-Nov-2015

