

**INFORMACION GENERAL**

**Nombre producto:**  
Garafos C

**Composición:**

Cada 100 mililitros de concentrado emulsionable contienen:

**Forma farmacéutica:**  
Emulsión

Ethion 83 g

**DATOS CLÍNICOS**

**Especies:**  
Bovinos.



**Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:**

**Categoría toxicológica II: Altamente tóxico.** ANTÍDOTO: Sulfato de atropina. En humanos aplicar por vía intramuscular 1 a 2 mg cada hora hasta un máximo de 10 a 20mg por día. En ganado aplicar por vía intramuscular o intravenosa 20 a 30 mg. Repetir a intervalos si es necesario. En caso de intoxicación, llame al Médico inmediatamente o lleve el paciente al Médico y muéstrela una copia de la etiqueta. En caso de intoxicación del animal, llamar al Médico Veterinario. Exclusivo de uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Producto tóxico en peces. Usar guantes de caucho y máscara al mezclar el producto. No fumar ni comer durante la aplicación. En caso de contacto accidental con piel y ojos lavar abundantamente con agua y jabón. Báñese y cambíese de ropa una vez finalizado el trabajo.

**Indicaciones:**

En bovinos para el control de las garrapatas *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* y *Amblyomma cajennense*, Piojos: *Haematopinus sp.*, *Linognathus sp.* y *Trichodectes sp.*; Moscas: *Haematobia sp.* y *Stomoxys sp.*

**Dosis/Vía de administración:**

Mangas de aspersión y bombas de mano: Mezclar 1 litro de Garafos® C por cada 1.300 litros de agua. Agregar 15 mL de Garafos® C por cada 20 litros de agua en bombas de mano. Generalmente cuando se utilizan bombas de mano, un animal requiere entre 4 y 5 litros de dilución. Mezclar la cantidad medida de Garafos® C con igual cantidad de agua. Agite bien hasta completa solubilización. Mezclar esta dilución con la cantidad total de agua en el tanque o bomba de mano.

**Tiempo de retiro:**

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y hasta 24 horas después de finalizado el mismo, no debe destinarse para el consumo humano.

**INFORMACION FARMACEUTICA**

**Lista de excipientes:**  
Fenil sulfonato de calcio y tergitol XD.

**Almacenamiento:**  
Manténgase el envase bien tapado y en lugar fresco.

**Vida útil:**  
36 Meses

**Presentación:**  
Envases en PEAD por 30, 154, 235, 470 y 1000 mL.



**TITULARIDAD**

**Información de contacto/Importador:**

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,  
Colombia

Teléfono: 571 592 5050

**Titular:**

Merck Sharp & Dohme Salud Animal S.A.S.

**Fabricante:**

Schering Plough Animal Health – Estados Unidos.

**Número Reg. ICA:**

905-DB

**Fecha emisión:**

15-Sep-1999

