

INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Halocur	Composición: Cada mL de solución oral contiene:
Forma farmacéutica: Solución	Halofuginona base (Como lactato) 0.5 mg

DATOS CLÍNICOS

Especies: Bovinos. 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: No administrar con el estómago vacío. No utilizar en caso de diarrea que persista por más de 24 horas y en animales débiles. Para el tratamiento de terneros anoréxicos, el producto debe administrarse diluido en medio litro de una solución de electrolitos. Los animales deben recibir suficiente calostro de acuerdo con las buenas prácticas de crianza. No exponer los animales a un segundo tratamiento. No tratar terneros mayores de 21 días. Si se observan signos clínicos de sobredosificación, el tratamiento debe suspenderse de inmediato y se debe alimentar al animal con leche o un sustituto de leche no medicados. Es probable que se requiera la rehidratación. En casos muy raros, se observa un aumento en el nivel de diarrea en animales tratados. Manténgase fuera del alcance de los niños. Uso veterinario. Manténgase a menos de 30°C. Una vez abierto el envase, utilizar antes de 6 meses.
Indicaciones: En terneros recién nacidos, para la prevención y el control de la diarrea causada por <i>Cryptosporidium parvum</i> .	Dosis/Vía de administración: Por vía oral para terneros después de haber sido alimentados. 35 kg < terneros ≤ 45 kg: 8 mL de Halocur® una vez al día durante 7 días consecutivos 45 kg < terneros < 60 kg: 12 mL de Halocur® una vez al día durante 7 días consecutivos. Para animales más livianos o pesados, se debe realizar un cálculo preciso (2 mL/10 kg). El tratamiento consecutivo debe administrarse diariamente a la misma hora. Una vez que el primer ternero haya sido tratado, todos los terneros recién nacidos deben ser sistemáticamente tratados mientras persiste el riesgo de diarrea provocada por <i>Cryptosporidium parvum</i> .
	Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 13 días después de finalizado el tratamiento.

INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: Acido benzoico, ácido láctico, tartrazina (E102), agua purificada.	Almacenamiento: Almacenar por debajo de 30°C.
Vida útil: 36 Meses	Presentación: Frasco de polietileno de alta densidad por 490 y 980 mL.



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia

Teléfono: 571 592 5050

Titular:

Intervet International B.V. - Holanda

Fabricante:

Intervet Productions S.A. - Francia

Número Reg. ICA:

9123-MV

Fecha emisión:

22-Ene-2013

