


INFORMACION GENERAL

Nombre producto: M NINEVAX C	Composición: Cada dosis de 0.01 mL de vacuna liofilizada contiene:
Forma farmacéutica: Vacuna liofilizada	<i>Pasteurella multocida</i> Cepa suave M-9 viva atenuada: 3,0 x 10 ⁸ UFC

DATOS CLÍNICOS

<p>Especies: Aves</p> 	<p>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Evite vacunar las aves durante períodos de tensión relacionados con el clima. Tampoco vacune durante 7 días antes o 7 días después de mover y manipular a las aves. Las aves que se han de vacunar no deben ingerir ningún antibiótico ni sulfonamida como prevención o tratamiento para cólera aviar durante 3 días antes y 5 días después de la vacunación. Evite que heridas abiertas del personal encargado de la vacunación entren en contacto con la vacuna o se inoculen con la misma, ya que ésto puede producir una infección bacteriana. Si ésto ocurre, contacte un doctor inmediatamente para obtener el tratamiento adecuado. USO VETERINARIO. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del médico veterinario.</p>																																																									
<p>Indicaciones:</p> <p>En pollas y pavos para la prevención del Cólera Aviar causado por <i>Pasteurella multocida</i>.</p>	<p>Dosis/Vía de administración: <u>Punción alar:</u> Pollas: a las 10- 12 semanas de edad y revacunar a las 18-20 semanas de edad. Pavos: a las 15-18 semanas de edad y revacunar 8 semanas después. Las pavas ponedoras se deben vacunar por lo menos 2 veces con vacuna viva vía oral antes de aplicar en el ala.</p> <p>La vacunación se lleva a cabo sumergiendo las agujas del aplicador en la vacuna mezclada, y perforando el tejido membranoso de la parte inferior del ala. Evite perforar a través de las plumas ya que éstas pueden absorber la vacuna. También evite golpear el músculo o el hueso del ala para minimizar reacciones en el animal. El aplicador está diseñado para recoger la cantidad adecuada de vacuna en las agujas, la que se deposita en los tejidos cuando se perfora el ala. Sumerja el aplicador en la botella de la vacuna antes de cada aplicación. Elimine el exceso de vacuna que se acumula en el aplicador tocando la pared interna del vial con el aplicador.</p> <p><u>Agua de bebida:</u> Pavos: 6-8 semanas de edad, revacunar 3 semanas después y repetir cada 4 - 6 semanas.</p> <p>No mezcle la vacuna con el agua de beber sino hasta el momento de administrarla. El agua se debe mezclar con leche en polvo para prevenir que el cloro u otros componentes del agua, inactiven o inestabilicen la bacteria en la vacuna. La leche en polvo se debe añadir al agua en una proporción de 3 g por 11 L (una cucharadita llena por tres galones americanos o 2,5 galones imperiales). Use sólo bebedores limpios y equipo libre de desinfectante o limpiadores. El agua debe retirarse por completo de las aves por lo menos 2 horas antes de la vacunación para asegurar que todos los pavos consumirán el agua con la vacuna. Mezcle la vacuna rehidratada en la cantidad apropiada de agua de beber (leche en polvo ya añadida), suficiente para que los pavos sedientos consuman aproximadamente en 2 horas. El horario siguiente es una guía general para calcular la cantidad de agua que se usa con la vacuna. Estas cantidades dependen de las condiciones de manejo individual, el clima, la edad y el sexo de las aves:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">EDAD (SEMANAS)</th> <th rowspan="2">SEXO</th> <th rowspan="2">CLIMA</th> <th colspan="3">CANTIDAD DE AGUA POR CADA 1000 DOSIS</th> </tr> <tr> <th>LITROS</th> <th>GALONES AMERICANOS</th> <th>GALONES IMPERIALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6-8</td><td>Machos</td><td>Caliente</td><td>95</td><td>25</td><td>21</td></tr> <tr><td>6-8</td><td>Hembras</td><td>Caliente</td><td>76</td><td>20</td><td>17</td></tr> <tr><td>6-8</td><td>Machos</td><td>Frio</td><td>49</td><td>13</td><td>11</td></tr> <tr><td>6-8</td><td>Hembras</td><td>Frio</td><td>38</td><td>10</td><td>8</td></tr> <tr><td>10-14</td><td>Machos</td><td>Caliente</td><td>133</td><td>35</td><td>29</td></tr> <tr><td>10-14</td><td>Hembras</td><td>Caliente</td><td>103</td><td>27</td><td>22</td></tr> <tr><td>10-14</td><td>Machos</td><td>Frio</td><td>68</td><td>18</td><td>15</td></tr> <tr><td>10-14</td><td>Hembras</td><td>Frio</td><td>53</td><td>14</td><td>12</td></tr> </tbody> </table> <p>No administre a través de tubería de agua con proporcionadores o tanques de medicamento.</p> <p>Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.</p>	EDAD (SEMANAS)	SEXO	CLIMA	CANTIDAD DE AGUA POR CADA 1000 DOSIS			LITROS	GALONES AMERICANOS	GALONES IMPERIALES	6-8	Machos	Caliente	95	25	21	6-8	Hembras	Caliente	76	20	17	6-8	Machos	Frio	49	13	11	6-8	Hembras	Frio	38	10	8	10-14	Machos	Caliente	133	35	29	10-14	Hembras	Caliente	103	27	22	10-14	Machos	Frio	68	18	15	10-14	Hembras	Frio	53	14	12
EDAD (SEMANAS)	SEXO				CLIMA	CANTIDAD DE AGUA POR CADA 1000 DOSIS																																																				
		LITROS	GALONES AMERICANOS	GALONES IMPERIALES																																																						
6-8	Machos	Caliente	95	25	21																																																					
6-8	Hembras	Caliente	76	20	17																																																					
6-8	Machos	Frio	49	13	11																																																					
6-8	Hembras	Frio	38	10	8																																																					
10-14	Machos	Caliente	133	35	29																																																					
10-14	Hembras	Caliente	103	27	22																																																					
10-14	Machos	Frio	68	18	15																																																					
10-14	Hembras	Frio	53	14	12																																																					



INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes:	Almacenamiento: Conservar entre 2°C y 8°C.
Vida útil: 12 Meses	Presentación: Fracción liofilizada en frasco 1000 dosis y diluyente en frasco de 10 mL.

TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Titular/Fabricante Intervet Inc. – Estados Unidos	
	Número Reg. ICA: 7136-BV	Fecha emisión: 28-Jun-2006

