

INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Mastiplan LC	Composición: Cada jeringa de 8 gramos contiene:
Forma farmacéutica: Suspensión	Cefapirina sódica: 316 mg (equivalente a 300 mg cefapirina base) Prednisolona: 20 mg

DATOS CLÍNICOS

Especies: Bovinos. 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Venta bajo fórmula del médico veterinario. No usar en caso de hipersensibilidad del animal a los antibióticos como cefalosporinas u otros antibióticos β-lactámicos o a cualquier otro ingrediente. No usar las toallas de limpieza sobre pezones con heridas abiertas. El uso del producto debe estar basado en pruebas de susceptibilidad, tomando en cuenta las políticas oficiales y locales para antimicrobianos. La jeringa solo debe ser usada una vez por pezón. Penicilinas y cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad (alergia) después de la inyección, inhalación, ingestión o contacto con la piel. La hipersensibilidad a penicilinas puede llevar a una sensibilidad cruzada a cefalosporinas y viceversa. Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser ocasionalmente severas. El operador no debe manejar este producto si se conoce que se es sensible a penicilinas o cefalosporinas o si ha sido advertido de no trabajar con estas preparaciones.
Indicaciones: Tratamiento de mastitis clínica en vacas lecheras en lactancia causadas por <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Staphylococcus coagulasa</i> negativos, <i>Streptococcus agalactiae</i> , <i>Streptococcus uberis</i> y <i>Escherichia coli</i> , sensibles a cefapirina.	Dosis/Vía de administración: Vía de administración: Intramamario. El contenido de una jeringa debe ser administrado dentro de cada cuarto afectado vía el canal del pezón, inmediatamente después de la ordeña, con 12 horas de intervalo, por cuatro ordeñas consecutivas. Antes de la administración, la ubre debe ser ordeñada completamente. El pezón y su orificio deben estar completamente limpios y desinfectados con una toalla de limpieza que viene con cada jeringa. Evitar la contaminación de la boquilla de la jeringa. Retirar la parte superior de la tapa y suavemente insertar alrededor de 5 mm o remover toda la tapa e insertar la longitud total de la boquilla en el canal del pezón. Administrar todo el contenido de la jeringa al interior del cuarto. Dispersar el producto masajeando suavemente el pezón y la ubre de la vaca afectada.
	Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 4 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 132 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: Glicerol monoestearato, calcio aluminosilicato de sodio y aceite de maní.	Almacenamiento: Almacenar entre 15°C y 30°C.
Vida útil: 36 Meses	Presentación: Jeringa en polietileno por 8 g. Caja plegadiza con 1 sachet de 20 jeringas de polietileno por 8 g y 20 toallas de limpieza.

Ficha técnica de producto



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050		Titular/Fabricante Intervet International B.V. - Holanda	
		Número Reg. ICA: 9752 - MV	Fecha emisión: 30-Jun-2016

