


INFORMACION GENERAL

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre producto: Nafpenzal DC | Composición: Cada inyector por 3 gramos contiene: Penicilina G procaínica 300.000 UI Sulfato de Dihidroestreptomicina 100 mg Nafcilina sódica 100 mg |
| Forma farmacéutica: Suspensión | |

DATOS CLÍNICOS

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especies: Bovinos.  | Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a antibióticos β-lactámicos o dihidroestreptomicina. No utilizar en animales en lactación. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Uso veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a una temperatura no mayor a 25°C. No congelar. |
| Indicaciones: En bovinos en periodo de seco para el tratamiento y control de las mastitis subclínicas, producidas por <i>Streptococcus sp.</i> , <i>Staphylococcus sp.</i> , <i>Arcanobacterium pyogenes</i> y <i>Escherichia coli</i> . | Dosis/Vía de administración: Aplicar una jeringa por cada cuarto en el momento en que la vaca inicia el período seco. Ordeñar bien la ubre hasta que quede completamente seca. Limpieza y desinfección del pezón. Remover la tapa del extremo de la jeringa. Introducir en el canal del pezón y administrar lentamente el contenido. Hacer masaje en el pezón y en cada cuarto para favorecer la dispersión del producto. |
| | Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 48 horas después del parto, no debe destinarse para el consumo humano. |

INFORMACION FARMACEUTICA

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lista de excipientes: Diestearato de aluminio. | Almacenamiento: Almacenar por debajo de 25°C. |
| Vida útil: 24 Meses | Presentación: Inyectores en polipropileno por 3 g de contenido. Caja con 4 inyectores por 3 g. Sobre de aluminio con 4 inyectores por 3 g. Caja con 20 inyectores por 3 g. |

TITULARIDAD

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050 | Titular/Fabricante Intervet International B.V. - Holanda | |
| | Número Reg. ICA: 2900- DB | Fecha emisión: 06-Nov-1996 |

