


**INFORMACION GENERAL**

<b>Nombre producto:</b> Nobilis RT INAC	<b>Composición:</b> Cada dosis contiene: Neumovirus (TRT virus inactivado) ≥ 50 EU.
<b>Forma farmacéutica:</b> Emulsión inyectable	

**DATOS CLÍNICOS**

<b>Especies:</b> Aves 	<b>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:</b> Vacunar solamente aves sanas. Antes de comenzar la vacunación, dejar que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15 - 25°C). Agitar antes y durante el empleo. Utilizar el vial de forma ininterrumpida una vez comenzada la extracción del contenido. Utilizar un equipo de vacunación estéril. No mezclar Nobilis RT inac con otras vacunas. En caso de inyección accidental a una persona, puede producirse una reacción local. Conviene consultar al médico inmediatamente, informándole que la vacuna es una emulsión de aceite. No utilice un equipo de vacunación con componentes de goma, ya que el excipiente de la vacuna podría dañarla. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Almacenar en la oscuridad en refrigeración entre 2-8°C. NO CONGELAR. USO VETERINARIO.
<b>Indicaciones:</b> Inmunización activa de pollos de cría y gallinas ponedoras, y de pavos de cría, para reducir la mortalidad y los signos clínicos (incluido la caída de la producción de huevos) inducidos por la infección por el virus de la rinotraqueítis aviar.	<b>Dosis/Vía de administración:</b> Administrar 0,5 ml/ave por vía intramuscular en el muslo o en la pechuga o por vía subcutánea en la parte baja del cuello. Nobilis RT Inac debe administrarse a pavos de aproximadamente 28 semanas de vida. Los pollos deberán ser vacunados aprox. a las 14-20 semanas de vida. En ningún caso se administrará la vacuna menos de 4 semanas antes del inicio del periodo de postura. Para un efecto de revacunación óptima las aves deben primovacunarse con la vacuna viva frente a la rinotraqueítis aviar. Los mejores resultados se obtienen cuando la vacunación se realiza al menos 4 semanas después de administrar la primovacunación con virus vivo.
	<b>Tiempo de retiro:</b> No aplica.

**INFORMACION FARMACÉUTICA**

<b>Lista de excipientes:</b>	<b>Almacenamiento:</b> Almacenar entre 2 – 8°C.
<b>Vida útil:</b> 18 meses	<b>Presentación:</b> Frasco PET por 500 mL de 1000 Dosis.

**TITULARIDAD**

<b>Información de contacto/Importador:</b> MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	<b>Titular/Fabricante</b> Intervet International BV - Holanda	
	<b>Número Reg. ICA:</b> 5647-DB	<b>Fecha emisión:</b> 05-Dic-2001

