

INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Nobivac DHPPI	Composición: Cada dosis de 1 mL contiene:	
Forma farmacéutica: Liofilizado + Diluyente	Virus del moquillo canino, cepa Onderstepoort	Minimo 4,0 log ₁₀ TCID ₅₀
	Adenovirus canino tipo 2, cepa Manhattan.	Minimo 4,0 log ₁₀ TCID ₅₀
	Virus del parvovirus canino, cepa 154	Minimo 7,0 log ₁₀ TCID ₅₀
	Virus de parainfluenza, cepa Cornell	Minimo 5,5 log ₁₀ TCID ₅₀

DATOS CLÍNICOS

Especies: Caninos 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No congelar. Después de la reconstitución, la vacuna se debe utilizar dentro de 30 minutos. Venta bajo fórmula del médico veterinario.
Indicaciones: Vacuna tetravalente a virus vivo para la prevención el moquillo, la hepatitis infecciosa, la parvovirus y la parainfluenza en caninos.	<p>Dosis/Vía de administración: Inyectar el contenido de un vial de vacuna reconstituída por vía subcutánea. Reconstituir inmediatamente antes de usar mediante la adición del contenido de un vial (1,0 mL) de Nobivac Lepto (vacuna de leptospirosis canina), un vial (1,0 mL) de Nobivac Rabia, un vial (1,0 mL) de Nobivac RL o un vial (1,0 mL) de Nobivac Solvent. La vacuna deberá utilizarse durante los 30 minutos siguientes a su reconstitución.</p> <p>Programa de vacunación: La edad preferida para la vacunación contra la hepatitis (AVC1), la infección por AVC2 y parainfluenza canina es a las 8-12 semanas de vida ya que probablemente ésta es la edad más precoz en la que los anticuerpos maternos residuales contra estas enfermedades habrán disminuido a niveles que probablemente no interferirán en la respuesta inmune. En la mayoría de los casos, ésta edad es entre las 6 y 9 semanas de vida pero sería aconsejable realizar la vacunación final contra éstas enfermedades a las 12 semanas de vida, con objeto de asegurar la protección de los cachorros individuales con niveles muy elevados de anticuerpos maternos. Se incluyen las siguientes recomendaciones ya que es probable que la inmunización con Nobivac DHPPI forme parte de pautas de vacunaciones más amplias, se incluyen las siguientes recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pauta para cachorros con posible exposición a moquillo y/o parvovirus antes de las 8-9 semanas de vida y de los que se desconoce el estado MDA: 4-6 semanas de vida. – Nobivac Parvo-C o Nobivac Puppy DP 8-9 semanas de vida. – Nobivac DH2 PPI con Nobivac L 12 semanas de vida. – Nobivac DH2 PPI con Nobivac L, Nobivac Rabia o Nobivac RL b. Pauta para cachorros en los que se inició la vacunación a las 8-9 semanas de vida: 8-9 semanas de vida. – Nobivac DH2PPI con Nobivac L 12 semanas de vida – Nobivac DH2 PPI con Nobivac L, Nobivac Rabia o Nobivac RL c. Pauta para cachorros en los que la vacunación no se inició antes de las 12 semanas de vida: 12 semanas de vida. – Nobivac DH2 PPI con Nobivac L, Nobivac Rabia o Nobivac RL 14-15 semanas de vida. – Nobivac L <p>Revacuación: Se recomienda que los perros se revacunen contra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moquillo canino, hepatitis canina – cada 2 años. 2. Parvovirus canino, enfermedad de parainfluenza canina – cada año. 3. Rabia – cada 3 años (puede modificarse para cumplir con los reglamentos locales). <p>Tiempo de retiro: No aplica.</p>



INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes:

Diluyente: Dihidrato de fosfato disódico, dihidrógeno fosfato de potasio, agua destilada estéril.

Almacenamiento:

Almacenar entre 2 – 8°C.

Vida útil:

24 Meses

Presentación:

Fracción liofilizada y diluyente en frascos de vidrio tipo I unidosis, en blíster por 10 unidades.

TITULARIDAD

Información de contacto/Importador:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia

Teléfono: 571 592 5050

Titular/Fabricante

Intervet International B.V. - Holanda

Número Reg. ICA:

9748 - BV

Fecha emisión:

23-Jun-2016

