

**INFORMACION GENERAL**

<b>Nombre producto:</b> Nobivac Puppy DP	<b>Composición:</b> Cada dosis contiene:
<b>Forma farmacéutica:</b> Liofilizado	Virus de moquillo canino Cepa Onderstepoort. 10 <sup>5</sup> DICC <sub>50</sub> Virus de parvovirus canino cepa clonada 154. 10 <sup>7</sup> DICC <sub>50</sub>

**DATOS CLÍNICOS**

<p><b>Especies:</b> Caninos</p> 	<p><b>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:</b></p> <p>Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No congelar. Venta bajo fórmula del médico veterinario. Solo deben vacunarse perros en buen estado de salud y deberá hacerse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación. Después de la vacunación, deben evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta 14 días después de la inoculación.</p>
<p><b>Indicaciones:</b></p> <p>Para inmunización activa de cachorros jóvenes contra el moquillo canino (VMC), y la enfermedad por Parvovirus canino (PVC) en cachorros a partir de la sexta semana de edad.</p>	<p><b>Dosis/Vía de administración:</b></p> <p>El contenido de un vial de vacuna reconstituida deberá inyectarse por vía subcutánea. Reconstituir inmediatamente antes de usar con la adición del contenido de un vial (1,0 mL) de Nobivac Solvent. La vacuna deberá utilizarse antes de los 30 minutos posteriores a su reconstitución.</p> <p><b>Programa de vacunación:</b></p> <p>Nobivac Puppy DP está indicado para el uso en animales con niveles elevados de MDA contra el virus del moquillo canino/parvovirus canino. La edad más temprana a la que éstos niveles no interfieren con la vacunación es de 6 semanas en la mayoría de animales. Para asegurar la protección de cachorros individuales que no responden a esta edad por niveles muy elevados de MDA y proporcionar protección contra hepatitis (AVC1), infecciones por AVC2 y parainfluenza, se aconseja revacunar con Nobivac DH2PPi. Se incluyen las siguientes recomendaciones ya que es probable que la inmunización con Nobivac Puppy DP forme parte de pautas de vacunación más amplias:</p> <p>4-6 semanas de vida. – Nobivac Puppy DP                  8-9 semanas de vida. - Nobivac DHPPi con Nobivac Lepto                  12 semanas de vida. – Nobivac DHPPi con Nobivac Lepto, Nobivac Rabia o Nobivac RL</p> <p><b>Revacunación:</b></p> <p>Se recomienda que los perros se revacunen contra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moquillo canino, hepatitis canina – Cada 2 años.</li> <li>2. Parvovirus canino, virus de parainfluenza canina – Cada año.</li> <li>3. Rabia – cada 3 años (Puede modificarse para cumplir con los reglamentos locales).</li> </ol>
	<p><b>Tiempo de retiro:</b></p> <p>No aplica.</p>



**INFORMACION FARMACEUTICA**

<b>Lista de excipientes:</b>	<b>Almacenamiento:</b> Almacenar entre 2 – 8°C.
<b>Vida útil:</b> 24 Meses	<b>Presentación:</b> Caja por 10 frascos por una dosis cada uno.

**TITULARIDAD**

<b>Información de contacto/Importador:</b> MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	<b>Titular/Fabricante</b> Intervet International B.V. - Holanda
	<b>Número Reg. ICA:</b> 4400-DB
	<b>Fecha emisión:</b> 22-Mar-1997

