

INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Oxirat L.A.PLUS	Composición: Cada 100 mL contienen:
Forma farmacéutica: Solución	Oxitetraciclina (Oxitetraciclina clorhidrato 21.6 g) 20 g Diclofenaco sódico (como diclofenaco base 0,93 g) 1 g

DATOS CLÍNICOS

Especies: Bovinos 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Uso veterinario. Utilizar el producto exclusivamente en la especie indicada. No administrar a hembras gestantes. No se debe administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas y/o que tengan alteraciones hepáticas o renales. No se indica para uso en équidos, perros y gatos. No administrar con antimicrobianos bactericidas. Tras la apertura del frasco, el producto debe consumirse en un máximo de 10 días y deben descartarse las eventuales sobras. Un posible oscurecimiento de la solución puede ocurrir, y esto no implica la pérdida de la calidad y eficacia del producto.
	Indicaciones: En bovinos de carne para el tratamiento de infecciones ocasionadas por bacterias sensibles a la oxitetraciclina tales como: <i>Bordetella bronchiseptica</i> , <i>Fusobacterium necrophorum</i> , <i>Streptococcus uberis</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Escherichia coli</i> y <i>Anaplasma marginale</i> , y únicamente cuando el animal manifieste signos clínicos asociados a la inflamación, como fiebre y dolor.
	Dosis/Vía de administración: Vía aplicación: intramuscular. La dosificación recomendada es de 1,0 mL/10 kg de peso corporal, que corresponde a 20 mg de oxitetraciclina/kg de peso y 1,0 mg de diclofenaco sódico/kg de peso para bovinos. Normalmente una dosis es suficiente para un tratamiento efectivo, pero en infecciones graves, una segunda dosis debe administrarse 3 días tras la primera aplicación. Volumen máximo recomendado por punto de aplicación: 10 mL. Las dosis superiores a las indicadas, administradas por vía intramuscular, se deben subdividir en dos o más puntos de aplicación. Las subdosificaciones pueden facilitar el desarrollo de la resistencia e interferir en la eficacia del tratamiento.
	Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta treinta y nueve (39) días después de finalizado el tratamiento. No administrar en vacas cuya leche se destina al consumo humano.

INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: 2-pirrolidona, Povidona K-17, Monoetanolamina, formaldehído sulfoxilato de sodio, EDTA disódico dihidratado, óxido de magnesio, propilenglicol, agua para inyección.	Almacenamiento: Almacenar entre 15 y 30°C
Vida útil: 24 Meses	Presentación: Frascos de vidrio tipo ámbar, cerrados con tapón de caucho y agrafe de aluminio por 50 ó 100 mL.



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050		Titular/Fabricante: Vallée - Brasil	
		Número Reg. ICA: 10531 - MV	Fecha emisión: 21-Feb-2020

