

**INFORMACION GENERAL**

<b>Nombre producto:</b> Porcilis App	<b>Composición:</b> Cada dosis (2 mL) de suspensión acuosa con 600 mg de antígenos contiene:
<b>Forma farmacéutica:</b> Suspensión	Concentrado de antígeno de ApxI (Toxoide de hemolisina tipo I): 50 Unidades. Concentrado de antígeno de ApxII (Toxoide de hemolisina tipo II): 25-78 Unidades. Concentrado de antígeno de ApxIII (Toxoide de toxina macrófago): 50 unidades. Concentrado de antígeno de OMP (Proteína de membrana): 50 Unidades

**DATOS CLÍNICOS**

<b>Especies:</b> Porcinos 	<b>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:</b> Vacunar sólo a cerdos en buen estado de salud. Mantener la vacuna en la oscuridad de entre 2 a 8°C, evitando que se congele. Permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiental (15-25°C) antes de utilizarla. Agitar la vacuna antes de utilizarla y durante su uso. No mezclarla con otras vacunas u otras sustancias. Utilizar jeringas y agujas estériles. Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Si no se ha utilizado a las 10 horas, los frascos abiertos deberán desecharse.
<b>Indicaciones:</b> Para la inmunización de cerdos sanos contra la pleuroneumonía porcina causada por <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> .	<b>Dosis/Vía de administración:</b> La vacuna tiene que administrarse en la musculatura profundamente detrás de la oreja en una dosis de 2 ml. Se deberá conseguir la máxima protección antes de iniciado el período de engorde. Se puede vacunar a los cerdos a partir de la edad de 6 semanas. Se precisan dos vacunaciones con un intervalo mínimo de 4 semanas. Se aconseja realizar éstas a las 6 y 10 semanas de vida.
	<b>Tiempo de retiro:</b> N/A

**INFORMACION FARMACEUTICA**

<b>Lista de excipientes:</b> Acetato de dl- $\alpha$ -tocoferol, polisorbato 80, simeticona, formalina, cloruro de sodio, agua para inyectables.	<b>Almacenamiento:</b> Almacenar entre 2 – 8°C.
<b>Vida útil:</b> 24 Meses	<b>Presentación:</b> Fracos de vidrio tipo II o de tereftalato de polipropileno (PET) con 10, 25, 50 o 125 dosis.

**TITULARIDAD**

<b>Información de contacto/Importador:</b> MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	<b>Titular/Fabricante</b> Intervet International B.V. – Holanda	
	<b>Número Reg. ICA:</b> 5527-DB	<b>Fecha emisión:</b> 21-Jun-2001

