


INFORMACION GENERAL

<p>Nombre producto: Porcilis AR-T DF</p>	<p>Composición: ORGANISMO MODIFICADO GENÉTICAMENTE</p>
<p>Forma farmacéutica: Suspensión</p>	<p>Cada dosis de 2 mL contiene:</p> <p>Proteína d0 (deleción no tóxica derivada de toxina dermonecrótica de <i>Pasteurella multocida</i>): 4 µg*</p> <p>Células de <i>Bordetella bronchiseptica</i> 10¹⁰**</p> <p>* Induce un título medio neutralizante ≥ 6,2 log₂ después de una vacunación repetida con media dosis en conejos.</p> <p>** Induce un título medio de aglutinación ≥ 5,5log₂ después de una vacunación de media dosis en conejos.</p>

DATOS CLÍNICOS

<p>Especies: Porcinos</p> 	<p>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:</p> <p>Agitar bien antes de usar y periódicamente durante la vacunación. Utilizar la totalidad del contenido en las 3 horas siguientes a la apertura del vial. Utilizar un equipo de vacunación estéril. En caso de inyección accidental buscar asistencia medica inmediata y mostrar la etiqueta o el inserto. Manténgase fuera del alcance de los niños. Vacunar solamente animales sanos. No combinar con otras vacunas. Almacenar en refrigeración entre 2-8°C. NO CONGELAR. Uso Veterinario.</p>
<p>Indicaciones:</p> <p>Vacunación de cerdas multiparas y nulíparas para proteger a su descendencia frente a la rinitis atrófica progresiva mediante la transferencia de anticuerpos maternos a través del calostro.</p>	<p>Dosis/Vía de administración:</p> <p>Administrar a cerdas una dosis de 2 mL, vía intramuscular profunda detrás de la oreja.</p> <p>Esquema de vacunación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vacunación básica: Aplicar una dosis por cerda, con una segunda vacunación 4 semanas después. La primera vacunación debe realizarse 6 semanas antes de la fecha esperada de parto. - Revacunación: Una dosis 2-4 semanas antes de cada parto subsecuente. <p>Tiempo de retiro: N/A</p>

INFORMACION FARMACEUTICA

<p>Lista de excipientes: Acetato de dl-α-tocoferol (adyuvante), cloruro de sodio, disodio fosfato dihidrato, potasio dihidrógeno fosfato, simeticona, polisorbato 80.</p>	<p>Almacenamiento: Almacenar entre 2 – 8°C.</p>
<p>Vida útil: 60 Meses</p>	<p>Presentación: Caja plegadiza que contiene viales en vidrio hidrolítico tipo I de 20 (10 dosis), 50 mL (25 dosis), 100 mL (50 dosis) o 250 mL (125 dosis). Frasco sellado con tapón de butilo y agrafe de aluminio.</p>



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia

Teléfono: 571 592 5050

Titular/Fabricante

Intervet International B.V. – Holanda

Número Reg. ICA:

8795-BV

Fecha emisión:

15-Dic-2011

