

INFORMACION GENERAL

<p>Nombre producto: Porcilis Ery+Parvo+Lepto</p>	<p>Composición:</p> <p>Cada dosis de 2 mL de vacuna contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> ≥ 1 ppd - Parvovirus porcino ≥ 65 U/ml - <i>Leptospira interrogans serovar Canicola</i> ≥ 1408 U/ml - <i>Leptospira interrogans serovar Icterohaemorrhagiae</i> ≥ 105 U/ml - <i>Leptospira interrogans serovar Australis</i> ≥ 655 U/ml - <i>Leptospira interrogans serovar Gryppotyphosa</i> ≥ 324 U/ml - <i>Leptospira interrogans serovar Pomona</i> ≥ 83 U/ml - <i>Leptospira interrogans serovar Tarassovi</i> ≥ 138 U/ml
<p>Forma farmacéutica: Suspensión</p>	

DATOS CLÍNICOS

<p>Especies: Porcinos</p> 	<p>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:</p> <p>Vacunar únicamente animales sanos. Antes de utilizar la vacuna, dejar que alcance la temperatura ambiente (15 - 25°C). Utilizar equipo de inyección estéril. Agitar el vial antes de su uso, y de modo intermitente durante el mismo. Si no se utilizan en el plazo de 10 horas, los viales abiertos deben ser desechados. No mezclar con otras vacunas o sustancias. Conservar protegido de la luz a una temperatura de 2 a 8°C. Evitar la congelación. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consulte al médico veterinario. Venta bajo fórmula del médico veterinario.</p>												
<p>Indicaciones:</p> <p>Para la inmunización activa de cerdas multíparas y nulíparas contra problemas reproductivos provocados por Parvovirus porcino y leptospirosis, para reducir los síntomas clínicos provocados por <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> y leptospirosis y para reducir la infección y excreción de Leptospiras.</p>	<p>Dosis/Vía de administración:</p> <p>Inyección intramuscular. Una dosis equivale a 2 ml.</p> <p>* Programa de vacunación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vacunación básica: Las cerdas que no han sido vacunadas con Porcilis Ery+Parvo+Lepto deben recibir una primera inyección de 6 a 8 semanas antes de la fecha prevista para la inseminación y una dosis de refuerzo 4 semanas más tarde. - Revacunación: Se debe aplicar una dosis sencilla de Porcilis Ery+Parvo+Lepto una vez al año, suplementada con un producto que contenga <i>Erysipelotrix rhusiopathiae</i> 6 meses después de cada vacunación con Porcilis Ery+Parvo+Lepto para mantener la inmunidad contra <i>Erysipelotrix rhusiopathiae</i>. 												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aparición inmunidad</th> <th>Duración inmunidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>E. rhusiopathiae</i></td> <td>3 semanas</td> <td>6 meses</td> </tr> <tr> <td>Parvovirus porcino</td> <td>10 semanas</td> <td>12 meses</td> </tr> <tr> <td>Leptospira serogrupos</td> <td>2 semanas</td> <td>12 meses</td> </tr> </tbody> </table>		Aparición inmunidad	Duración inmunidad	<i>E. rhusiopathiae</i>	3 semanas	6 meses	Parvovirus porcino	10 semanas	12 meses	Leptospira serogrupos	2 semanas	12 meses	<p>Tiempo de retiro: N/A</p>
	Aparición inmunidad	Duración inmunidad											
<i>E. rhusiopathiae</i>	3 semanas	6 meses											
Parvovirus porcino	10 semanas	12 meses											
Leptospira serogrupos	2 semanas	12 meses											

INFORMACION FARMACEUTICA

<p>Lista de excipientes: Acetato de dl-α-tocoferol (adyuvante), polisorbato 80, simeticona.</p>	<p>Almacenamiento: Almacenar entre 2 – 8°C.</p>
<p>Vida útil: 24 Meses</p>	<p>Presentación: Frascos PEAD por 10, 25, 50 y 125 dosis.</p>



PORCILIS ERY+PARVO+LEPTO
PRODUCTO BIOLÓGICO



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050		Titular/Fabricante Intervet International B.V. – Holanda	
		Número Reg. ICA: 9754-BV	Fecha emisión: 21-Jul-2016

