


INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Porcilis Ileitis	Composición: Cada dosis de 2 mL de bacterina contiene:
Forma farmacéutica: Suspensión	<i>Lawsonia intracellularis</i> inactivada. ≥ 1.2 PR

DATOS CLÍNICOS

Especies: Porcinos 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Conservar entre 2 – 8°C. No se debe administrar a cerdas gestantes ni en lactación. Una vez abierto el envase, utilice todo su contenido.
Indicaciones: En cerdos mayores de tres (3) o más semanas de edad para el control de la ileitis ocasionada por <i>Lawsonia intracellularis</i> . Para reducir la colonización y excreción de <i>Lawsonia intracellularis</i> .	Dosis/Vía de administración: Agite bien. Permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de administrarla. Utilizando una técnica aséptica, inyecte una dosis de 2 mL por vía intramuscular.
	Tiempo de retiro: N/A

INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: Microsol, fortasol, hepes, EDTA (17,5%), solución salina, gentamicina, timerosal.	Almacenamiento: Almacenar entre 2 – 8°C.
Vida útil: 24 Meses	Presentación: Viales en PET por 100 mL (50 dosis), 500 mL (250 dosis), 1000 mL (500 dosis).

TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Titular/Fabricante Intervet Inc. – Estados Unidos
	Número Reg. ICA: 9853-BV
	Fecha emisión: 28-Dic-2016

