


INFORMACION GENERAL

<p>Nombre producto: Porcilis PCV M Hyo</p>	<p>Composición: Cada dosis de 2 mL contiene: Antígeno subunitario ORF 2 del circovirus porcino tipo 2: ≥ 1414 AU <i>M. hyopneumoniae</i> inactivado: ≥ 2.69 RPU</p>
<p>Forma farmacéutica: Emulsión inyectable</p>	

DATOS CLÍNICOS

<p>Especies: Porcinos</p> 	<p>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:</p> <p>Vacunar únicamente a animales sanos. Si usted se administra accidentalmente este producto, aunque se trate sólo de una cantidad muy pequeña, consulte inmediatamente a un médico y muéstrele el prospecto del empaque. Agitar bien antes de usar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar en refrigeración entre 2-8°C. NO CONGELAR - Protéjase de la luz. Una vez abierta, la vacuna debe aplicarse dentro de las siguientes 8 horas. Uso Veterinario.</p>
<p>Indicaciones:</p> <p>Para la inmunización activa de cerdos con el fin de reducir la carga viral en órganos y tejidos linfoides, la eliminación del virus, provocado por infecciones de PCV2 y la severidad de las lesiones pulmonares ocasionadas por infección con <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>. Así mismo, para disminuir la pérdida diaria de peso y la mortalidad asociada con el PCV2 y/o la infección con <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>.</p> <p>Inicio de inmunidad con vacunación de una sola dosis: PCV2: 2 semanas - <i>M. hyopneumoniae</i>: 4 semanas</p> <p>Inicio de inmunidad con vacunación multidosis: PCV2: 18 días después de la primera vacunación. – <i>M. hyopneumoniae</i>: 3 semanas después de la segunda vacunación.</p> <p>Duración de la inmunidad (ambos esquemas): PCV2: 22 semanas después de la última vacunación. – <i>M. hyopneumoniae</i>: 21 semanas después de la última vacunación.</p>	<p>Dosis/Vía de administración:</p> <p>Vacunar a los cerdos por vía intramuscular.</p> <p>Esquema de una sola dosis: Una sola dosis de 2 mL en cerdos a partir de las 3 semanas de edad.</p> <p>Esquema de dosis repetidas: Una dosis repetida de 1 mL en cerdos comenzando a los 3 días de edad con un intervalo de al menos 18 días.</p> <p>Cuando ocurren infecciones por cualquiera de los agentes en forma temprana, se recomienda el esquema de dosis repetidas.</p> <p>Antes de aplicar la vacuna permita que alcance la temperatura ambiente y agite bien el frasco antes de utilizar.</p> <p>Tiempo de retiro: N/A</p>

INFORMACION FARMACEUTICA

<p>Lista de excipientes: Aceite mineral ligero, monooleato de sorbitán, polisorbato 80, hidróxido de aluminio 3%, alcohol etílico (etanol 96%), glicerol (50 % en solución salina).</p>	<p>Almacenamiento: Conservar entre 2° y 8°C.</p>
<p>Vida útil: 21 Meses</p>	<p>Presentación: Frascos en PET por 20 mL (10 dosis), 50 mL (25 dosis), 100 mL (50 dosis), 200 mL (100 dosis), 500 mL (250 dosis).</p>



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia

Teléfono: 571 592 5050

Titular/Fabricante

Intervet International B.V. – Holanda

Número Reg. ICA:

10161-BV

Fecha emisión:

19-Abr-2018

