


**INFORMACION GENERAL**

<b>Nombre producto:</b> Porcilis PCV	<b>Composición:</b> Cada dosis de 2 mL contiene:
<b>Forma farmacéutica:</b> Emulsión inyectable	Antígeno de subunidad ORF2 del Circovirus Porcino tipo 2 $\geq$ 4.5 título de anticuerpos log <sub>2</sub>

**DATOS CLÍNICOS**

<b>Especies:</b> Porcinos 	<b>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:</b> Vacunar animales sanos únicamente. Agitar bien antes de utilizar. Antes de utilizar la vacuna, permita que alcance la temperatura ambiente (15-25°C) y agite bien antes de su uso. Utilizar jeringas y agujas estériles. Evitar la introducción de contaminación. Evitar el uso de equipo de vacunación con partes de caucho. Si usted es inyectado de forma accidental con este producto, busque asesoría médica oportuna incluso si una cantidad muy pequeña es inyectada y lleve el inserto del empaque con usted. Mantener fuera del alcance de los niños. No congelar. Conservar entre 2° y 8°C. Proteger de la luz. Vida útil después de abrir el recipiente por primera vez: 8 horas. Uso Veterinario
<b>Indicaciones:</b> Para la inmunización activa de cerdos, con el fin de reducir la carga vírica en sangre y tejidos linfoides y para reducir la mortalidad y pérdida de peso asociada a la infección con PCV2 que se produce durante el período de cebo.	<b>Dosis/Vía de administración:</b> En el caso de bajos niveles de anticuerpos maternos contra PCV-2 o cuando PCVD es diagnosticada en cerdos en una edad tardía, una sola vacunación es recomendada: Administrar una dosis de 2 ml, por inyección intramuscular en el cuello detrás de la oreja, a partir de una edad de 3 semanas. En el caso en que se espera que niveles más altos de anticuerpos maternos contra PCV-2 estén presentes, administrar por inyección intramuscular en el cuello detrás de la oreja, de acuerdo con el siguiente esquema: - La primera inyección (2 ml) puede ser administrada desde una edad de 3-5 días, la segunda inyección (2 ml) 2-3 semanas después.
	<b>Tiempo de retiro:</b> N/A

**INFORMACION FARMACEUTICA**

<b>Lista de excipientes:</b> Composición de diluyente diluvac forte: $\alpha$ -tocoferol acetato, parafina líquida clara, polisorbato 80, simeticona, agua para inyección.	<b>Almacenamiento:</b> Conservar entre 2° y 8°C.
<b>Vida útil:</b> 36 Meses	<b>Presentación:</b> Viales en PET por 20 mL (10 dosis), 50 mL (25 dosis), 100 mL(50 dosis), 200 mL (100 dosis), 500 mL (250 dosis).

**TITULARIDAD**

<b>Información de contacto/Importador:</b> MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	<b>Titular/Fabricante</b> Intervet International B.V. – Holanda
	<b>Número Reg. ICA:</b> 9132-BV
	<b>Fecha emisión:</b> 31-Ene-2013

