

INFORMACION GENERAL

| | |
|--|--|
| Nombre producto: Procyon HCPCh+FeLV | Composición: Cada dosis de 1 mL contiene: Fracción liofilizada: |
| Forma farmacéutica: Liofilizada + Suspensión | Virus de la Rinotraqueítis Felina (FVR) cepa 593-J: $\geq 10_{4,7}$ UFP. Calicivirus Felino (FCV): $\geq 10_{3,1}$ UFP. Virus de la <i>Panleucopenia Felina</i> (FPL): $\geq 10_{3,0}$ FAID ₅₀ . <i>Chlamydia psittaci</i> cepa Baker: $\geq 10_{2,5}$ YSLD ₅₀ . Fracción líquida: Virus de la Leucemia Felina: ≥ 1 RP |

DATOS CLÍNICOS

| | |
|---|--|
| Especies: Felinos  | Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Aplicar solamente en gatos sanos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. No mezclar con otras vacunas. Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR. USO VETERINARIO. No vacunar hembras preñadas. La vacunación con este producto no brinda protección cruzada contra el virus de la inmunodeficiencia felina, otro retrovirus felino. |
| Indicaciones: Para la inmunización activa de gatos sanos como ayuda en la prevención de las enfermedades producidas por el virus de la Rinotraqueítis felina, el Calicivirus felino, el virus de la Panleucopenia felina y <i>Chlamydia psittaci</i> , y como ayuda en la prevención de los tumores linfoides y las enfermedades asociadas con la infección por el Virus de la Leucemia felina. | Dosis/Vía de administración: Previo a su uso, permitir que la fracción líquida alcance la temperatura ambiente y agitar bien. Transferir el contenido del vial de Procyon® FeLV en forma aséptica al vial de Procyon® HCPCh. Mezclar suavemente hasta la completa reconstitución. El contenido del vial de vacuna reconstituida (1 mL) debe administrarse por vía subcutánea o intramuscular inmediatamente después de la reconstitución. Programa de vacunación: Para la vacunación inicial se requieren dos dosis, la primera a las 9 semanas de edad o más. La segunda 3-4 semanas después de la primera dosis. Revacunar cada dos años con una dosis de Procyon HCPCh+FeLV. En los años intermedios vacunar con una dosis de Procyon HCPCh. |
| | Tiempo de retiro: No aplica. |

INFORMACION FARMACEUTICA

| | |
|---|---|
| Lista de excipientes: NZ Amina, gelatina, sacarosa, medio de cultivo tisular, carbopol. | Almacenamiento: Almacenar entre 2 – 8°C. |
| Vida útil: 18 Meses | Presentación: Fracos viales de vidrio tipo I por dosis. Caja por 25 frascos por una dosis cada uno. |



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia

Teléfono: 571 592 5050

Titular/Fabricante

Intervet Inc – Estados Unidos

Número Reg. ICA:

9045-BV

Fecha emisión:

02-Ago-2012

