

<b>FICHA TÉCNICA</b>	
<b>Información General</b>	
<b>Nombre:</b> ROTAVEC CORONA	
<b>Registro ICA:</b> 9750 BV	
<b>Principio Activo:</b> Rotavirus, Coronavirus, <i>Escherichia coli</i> .	
<b>Composición Garantizada</b>	
Cada dosis de 2 mL antes de inactivar contiene:	
Rotavirus bovino, cepa UK-Compton, serotipo G6 P5	10 <sup>7,6</sup> - 10 <sup>7,9</sup> TCID <sub>50</sub>
Coronavirus bovino, cepa Mebus	150 - 230 unidades ELISA
<i>E. coli</i> , adhesina F5 (K99)	100 - 120 unidades ELISA
<b>Forma Farmacéutica:</b> Emulsión inyectable.	
<b>Presentación:</b> Viales de vidrio que contienen 1, 5, 20 y 50 dosis.	
<b>País de Origen:</b> Alemania.	
<b>Descripción</b>	
Vacuna inactivada para inmunización activa de vacas y novillas y transferencia de inmunidad pasiva a la progenie por medio del calostro.	
<b>Indicaciones</b>	
Vacuna inactivada para inmunización activa de vacas y novillas preñadas contra el antígeno F5 adhesina F5 (K99) de <i>E. coli</i> , Rotavirus y Coronavirus.	
<b>Dosis y vía de Administración</b>	
2 ml por inyección intramuscular en el cuello. Una sola dosis se debe administrar durante cada gestación entre las 12 y 3 semanas previas a la fecha esperada de parto.	
<b>Precauciones</b>	
Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario Almacenar en refrigeración entre 2-8°C. NO CONGELAR - Protéjase de la luz. Utilizar todo el contenido antes de 8 horas después de abierto. <b>USO VETERINARIO</b>	