


INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Sofomax	Composición:
Forma farmacéutica: Suspensión	Cada 100 mL de suspensión oral contienen: Triclabendazol 10g , Abamectina 0,2 g

DATOS CLÍNICOS

Especies: Bovinos, ovinos 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: No administrar en terneros menores de 4 meses de edad. Almacenar a temperatura inferior a 30°C. Manténgase fuera del alcance de los niños. Uso Veterinario
Indicaciones: En bovinos y ovinos para el control de los nematodos gastrointestinales: <i>Toxocara sp</i> , <i>Haemonchus sp</i> , <i>Ostertoglia sp</i> , <i>Trichostrongylus sp</i> , <i>Cooperia sp</i> , <i>Nematodirus sp</i> , <i>Strongyloides sp</i> , <i>Bunostomum spp</i> , <i>Oesophagostomum sp</i> , <i>Trichuris sp</i> , <i>Dictyocaulus sp</i> . y <i>Fasciola hepática</i> .	Dosis/Vía de administración: Administración via oral Bovinos: 10 ml por cada 100 kilos de peso. Ovinos: 1 mL por cada 10 kilos de peso.
	Tiempo de retiro: Los bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento. No administrar a bovinos en producción de leche para el consumo humano. Los ovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.

INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: Dioxido de silicio, povidona, carboximetilcelulosa sódica, propilparabeno, metilparabeno, alcohol bencílico, citrato de sodio, ácido cítrico monohidrato y agua purificada.	Almacenamiento: Almacenar por debajo de 30°C.
Vida útil: 24 Meses	Presentación: Frasco en PEAD por 20, 100, 250, 500 y 1000 mL. 2 y 2,5 L

TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Titular: Intervet International B.V. - Holanda
	Fabricante: Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda. - Brasil
	Número Reg. ICA: 6123-MV
	Fecha emisión: 27-May-2003

