


INFORMACION GENERAL

| | |
|--|--|
| Nombre producto: Triatox | Composición: |
| Forma farmacéutica: Solución | Cada 100 mililitros contienen: Amitraz técnico 12.5 g |

DATOS CLÍNICOS

| | |
|---|--|
| Especies: Bovinos  | Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Categoría toxicológica III: Medianamente tóxico. Usar guantes de caucho y máscara al mezclar el producto. No fumar ni comer durante la aplicación. En caso de contacto accidental con piel y ojos, lavar abundantemente con agua y jabón. Báñese y cámbiese de ropa una vez finalizado el trabajo. En caso de intoxicación, llame al Médico inmediatamente o lleve el paciente al Médico y muéstrelle una copia de esta etiqueta. No hay antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático. En caso de intoxicación del animal llamar al Médico Veterinario. No usar en baños de inmersión. No usar en equinos. No tratar animales menores de 3 meses de edad. Exclusivo para uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantenga el envase bien tapado. Almacenar a una temperatura inferior a 30°C. |
| | Dosis/Vía de administración: Mangas de aspersión y bombas de mano: Mezclar 1 litro de TRIATOX® por cada 600 litros de agua. La dilución debe prepararse inmediatamente antes de usarse. Generalmente cuando se utilizan bombas de mano, un animal requiere entre 4 y 5 litros de dilución. En caso de <i>Boophilus microplus</i> (garrapata de un solo huésped), bañar cada 21 días. En infestaciones graves bañar cada 10 días, hasta obtener un buen control. Después continuar bañando cada 21 días. En caso de <i>Amblyomma cajennense</i> (garrapata de tres huéspedes), bañar cada 7 días. |
| Indicaciones: En bovinos para el control de las garrapatas <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> y <i>Amblyomma cajennense</i> . | Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y hasta 24 horas después de finalizado el mismo no debe destinarse para el consumo humano. |

INFORMACION FARMACEUTICA

| | |
|--|--|
| Lista de excipientes: Nonil fenol etoxilato, 3,4 epoxiciclohexilcarboxilato y solvesso 159 (solvente aromático). | Almacenamiento: Almacenar por debajo de 30°C. |
| Vida útil: 36 Meses | Presentación: Envases en PEAD por 33, 100, 235, 470 y 1000 mL. |



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia
Teléfono: 571 592 5050

Titular

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Fabricante:

Schering Plough Animal Health – Estados Unidos.

Número Reg. ICA:

1111-DB

Fecha emisión:

15-Sep-1999

