


INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Univax 2S	Composición: Cada dosis de vacuna contiene Virus activo de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio, cepa ST-12 no menos de 10 ^{2.3} TCID ₅₀ , Virus activo de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio, cepa 51-A no menos de 10 ^{2.9} TCID ₅₀
Forma farmacéutica: Liofilizado	

DATOS CLÍNICOS

Especies: Aves 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Almacénese refrigerado entre 2° a 7°C. NO CONGELAR. Esta vacuna contiene gentamicina como agente conservador.																
Indicaciones: En pollos de dos semanas de edad en adelante como ayuda en la prevención de la Bursitis infecciosa o enfermedad de Gumboro.	Dosis/Vía de administración: Verter la vacuna rehidratada dentro del volumen de agua corespondiente a la cantidad de aves, teniendo en cuenta su edad. Distribuya la vacuna diluida de manera que todas las aves puedan beber dentro del término de una hora. La vacuna diluida deberá ser lo único que puedan beber hasta que ésta se haya consumido completamente. No proporcione agua a las aves antes de la vacunación a fin de desarrollar sed en las mismas. Lave y enjuague bien los bebedores para quitar todo residuo de desinfectantes. Diluya la vacuna inmediatamente antes de usarla con agua limpia, fresca y sin cloro (con la leche añadida). Vierta la vacuna rehidratada dentro de los siguientes volúmenes de agua y mezcle bien: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cada 1000 aves</th> <th>Galones E.U.A.</th> <th>Galones imperiales</th> <th>Litros métricos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 a 4 semanas de edad</td> <td>2,5</td> <td>2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>4 a 8 semanas de edad</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Más de 8 semanas de edad</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> Evite la exposición del agua al sol.	Cada 1000 aves	Galones E.U.A.	Galones imperiales	Litros métricos	2 a 4 semanas de edad	2,5	2	10	4 a 8 semanas de edad	5	4	20	Más de 8 semanas de edad	10	8	40
Cada 1000 aves	Galones E.U.A.	Galones imperiales	Litros métricos														
2 a 4 semanas de edad	2,5	2	10														
4 a 8 semanas de edad	5	4	20														
Más de 8 semanas de edad	10	8	40														
	Tiempo de retiro: No aplica.																

INFORMACION FARMACÉUTICA

Lista de excipientes: Estabilizador: Amina NZ, lactosa, fosfato dibásico de potasio, fosfato monobásico de potasio, Acido L-glutámico, agua desionizada, gentamicina.	Almacenamiento: Almacenar entre 2 – 8°C.
Vida útil: 27 meses	Presentación: Fracos de vidrio tipo 1 por 2500 Dosis y 5000 Dosis. Caja con 10 viales por 2500 o 5000 Dosis.



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia

Teléfono: 571 592 5050

Titular/Fabricante

Intervet Inc -Estados Unidos

Número Reg. ICA:

7715-BV

Fecha emisión:

15-Sep-2008

