

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre producto: INNOFUSION-ND-ILT	Composición: ORGANISMO MODIFICADO GENÉTICAMENTE Cada dosis de 0,2 mL contiene:	≥ 4460 UFP
Forma farmacéutica: Vacuna Congelada	Cepa viva de herpesvirus de pavo HVT/NDV/ILT. Excipientes (Suero Bovino, Dimetilsulfóxido, Sulfato de Gentamicina) c.s.p. 1 dosis.	

DATOS CLÍNICOS

Especies: Aves 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso Veterinario. Manténgase fuera del alcance de las niños y animales domésticos. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Únicamente vacunar embriones y pollitos sanos. Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta veintiun (21) días después de finalizado el tratamiento. Almacene la vacuna en nitrógeno líquido. El personal debe usar los Elementos de Protección Personal (EPP) al manipular el producto.
	Dosis/Vía de administración: Diluya la vacuna de acuerdo a la dosis por embrión que se ha de administrar por la ruta <i>in ovo</i> . Por cada 1000 dosis de 0.1 ml/embrión, use 100 ml de diluyente estéril; o por cada 1000 dosis de 0.05 ml/embrión, use 50 ml de diluyente estéril. Para vacunar por vía subcutánea, utilice 200 ml de diluyente estéril por cada 1000 dosis de 0.2 ml por pollo. <u>Administración <i>in ovo</i>:</u> 1. Inocule cada embrión de pollo de 18 días de edad con una dosis completa de 0.05 ml ó 0.1 ml. 2. Todo el contenido del recipiente se debe usar en menos de una hora de haber mezclado la vacuna, o se debe desechar. 3. La vacuna, una vez reconstituida, se debe mantener en un lugar fresco y se debe agitar leve y frecuentemente. <u>Administración por vía Subcutánea:</u> 1. Sostenga el pollo por la nuca y con el dedo pulgar y el índice suavemente estire la piel de la nuca levantando la piel. Inserte la aguja, debajo de la piel levantada, en dirección opuesta a la cabeza del pollo, administrando 0.2 ml por pollo. 2. Evite que la aguja entre en contacto con los músculos o los huesos del cuello. 3. Todo el contenido del recipiente se debe usar en menos de una hora de haber mezclado la vacuna, o se debe desechar.
Indicaciones: Inmunización activa de pollos (embriones de 18 días de incubación y pollitos de 1 día de edad) para reducir la mortalidad y los signos clínicos asociados a los Virus de la Enfermedad de Newcastle, Laringotraqueítis Infecciosa y Enfermedad de Marek.	Tiempo de retiro: Los animales tratados no deber sacrificarse para consumo humano hasta veintiún (21) días después de finalizado el tratamiento.

INFORMACION FARMACÉUTICA

Lista de excipientes: Suero Bovino, dimetilsulfóxido, sulfato de gentamicina	Almacenamiento: Almacene la vacuna en nitrógeno líquido.
Vida útil: 36 meses	Presentación: Ampolletas de vidrio tipo I por 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 dosis. Bolsas de Polietileno con disolvente por 200, 500 o 1.200 ml.

TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Titular/Fabricante: Intervet Inc.	
	Número Reg. ICA: 10690-BV	Fecha emisión: 25-nov-2020

Ficha técnica de producto

