

**INFORMACION GENERAL**

<p><b>Nombre producto:</b> Porcilis Coliclos</p>	<p><b>Composición:</b> ORGANISMO MODIFICADO GENÉTICAMENTE</p>												
<p><b>Forma farmacéutica:</b> Suspensión</p>	<p>Cada dosis de 2 mL contiene:</p> <table border="0"> <tr> <td>Adhesina fimbrial F4 ab de <i>E. coli</i>.</td> <td>400U<sup>^</sup>1</td> </tr> <tr> <td>Adhesina fimbrial F4 ac de <i>E. coli</i>.</td> <td>120 U<sup>^</sup>1</td> </tr> <tr> <td>Adhesina fimbrial F5 de <i>E. coli</i>.</td> <td>400 U<sup>^</sup>1</td> </tr> <tr> <td>Adhesina fimbrial F6 de <i>E. coli</i>.</td> <td>1000 U<sup>^</sup>1</td> </tr> <tr> <td>Toxoide LT de <i>E. coli</i></td> <td>800 ng<sup>^</sup>1</td> </tr> <tr> <td><i>Clostridium perfringes</i> tipo C</td> <td>120 U<sup>^</sup>2</td> </tr> </table>	Adhesina fimbrial F4 ab de <i>E. coli</i> .	400U <sup>^</sup> 1	Adhesina fimbrial F4 ac de <i>E. coli</i> .	120 U <sup>^</sup> 1	Adhesina fimbrial F5 de <i>E. coli</i> .	400 U <sup>^</sup> 1	Adhesina fimbrial F6 de <i>E. coli</i> .	1000 U <sup>^</sup> 1	Toxoide LT de <i>E. coli</i>	800 ng <sup>^</sup> 1	<i>Clostridium perfringes</i> tipo C	120 U <sup>^</sup> 2
Adhesina fimbrial F4 ab de <i>E. coli</i> .	400U <sup>^</sup> 1												
Adhesina fimbrial F4 ac de <i>E. coli</i> .	120 U <sup>^</sup> 1												
Adhesina fimbrial F5 de <i>E. coli</i> .	400 U <sup>^</sup> 1												
Adhesina fimbrial F6 de <i>E. coli</i> .	1000 U <sup>^</sup> 1												
Toxoide LT de <i>E. coli</i>	800 ng <sup>^</sup> 1												
<i>Clostridium perfringes</i> tipo C	120 U <sup>^</sup> 2												

**DATOS CLÍNICOS**

<p><b>Especies:</b> Porcinos</p> 	<p><b>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:</b></p> <p>Uso veterinario. Venta bajo fórmula del médico veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Conservar entre 2 – 8°C. No congelar. ORGANISMO MODIFICADO GENÉTICAMENTE. Puede utilizarse durante la preñez. No mezclar con cualquier otro producto medicinal veterinario.</p>
<p><b>Indicaciones:</b></p> <p>Para la inmunización pasiva de la progenie por inmunización activa de cerdas multíparas o primerizas para reducir la mortalidad y signos clínicos durante los primeros días de vida, causados por cepas de <i>E. coli</i> que expresan las adhesinas F4ab, F4ac, F5, F6 causadas por el <i>Clostridium perfringes</i> tipo C.</p>	<p><b>Dosis/Vía de administración:</b></p> <p>Inyección intramuscular en cerdas multíparas y primerizas de 1 dosis (2 mL) de la vacuna en el cuello en el área detrás del oído.</p> <p><b>ESQUEMA DE VACUNACIÓN:</b> Vacunación básica: a las cerdas multíparas/primerizas que aún no han sido vacunadas con el producto se les administra una inyección primaria 6 a 8 semanas antes de la fecha esperada de parto y una inyección de refuerzo 4 semanas después.</p> <p>Revacunación: Una revacunación única es realizada 2 a 4 semanas antes de la fecha de parto esperada.</p> <p><b>Tiempo de retiro:</b> N/A</p>

**INFORMACION FARMACEUTICA**

<p><b>Lista de excipientes:</b> Acetato de dl-<math>\alpha</math>-tocoferol (adyuvante), polisorbato 80, simeticona, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, Na<sub>5</sub>HPO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O, diluyente agua para inyección.</p>	<p><b>Almacenamiento:</b> Almacenar entre 2 – 8°C.</p>
<p><b>Vida útil:</b> 24 Meses</p>	<p><b>Presentación:</b> Viales en PET por 20, 50, 100, 200 y 250 mL con 10, 25, 50, 100 y 125 dosis respectivamente. Viales en vidrio tipo I por 20, 50, 100 y 250 mL con 10, 25, 50 y 125 dosis respectivamente.</p>



**TITULARIDAD**

**Información de contacto/Importador:**

**MSD Salud Animal Colombia S.A.S.**

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,  
Colombia

Teléfono: 571 592 5050

**Titular/Fabricante**

Intervet International B.V. – Holanda

**Número Reg. ICA:**

9363-BV

**Fecha emisión:**

19-Mar-2014

