


INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Bravecto Spot On	Composición: Cada mL de solución tópica (Spot On) contiene:
Forma farmacéutica: Solución tópica (Spot On)	Fluralaner: 280 mg

DATOS CLÍNICOS

Especies:

Caninos, Felinos



Indicaciones:

Gatos: Para el tratamiento de infestaciones por garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes scapularis*, *I. hexagonus*) y pulgas (*Ctenocephalides felis*) en gatos. Para el tratamiento de infestaciones con ácaros de los oídos (*Otodectes cynotis*).

Perros: Para el tratamiento de infestaciones por garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes scapularis*, *I. hexagonus* y *Haemaphysalis elliptica*) y pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*) en perros.

Un tratamiento previene por 12 semanas la transmisión de *Dipylidium caninum* de pulgas infectadas a perros susceptibles. Para el tratamiento de demodicosis causada por ácaros (*Demodex spp.*), infestaciones con ácaros de los oídos (*Otodectes cynotis*) e infestaciones con sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei*).

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:

Uso veterinario. Consulte al médico veterinario. Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos. Para uso tópico. Causa irritación moderada en los ojos. No utilice directamente sobre lesiones de piel. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo. Las pipetas deben conservarse dentro del sobre de plástico para evitar la pérdida del solvente o la absorción de humedad. Los empaques deben abrirse justo antes de ser utilizados. No almacenar a más de 30°C. El producto es altamente inflamable.

GATOS: No debe utilizarse en gatitos menores de 9 semanas de edad y/o gatos que pesen menos de 1,2 kg.

PERROS: No debe utilizarse en cachorros de menos de 8 semanas de edad y/o perros que pesen menos de 2 kg. Muy raramente se han notificado emesis, letargo e inapetencia en informes espontáneos después del uso de este producto.

Dosis/Vía de administración:

Uso tópico

Gatos:

Peso del gato (kg)	Pipetas a utilizarse
1,2-2,8	1 de 112,5 mg
> 2,8 - 6,25	1 de 250 mg
> 6,25 - 12,5	1 de 500 mg

Para gatos de más de 12,5 kg, use una combinación de dos pipetas que se ajuste al peso del animal.

Perros:

Peso del perro (kg)	Pipetas a utilizarse
2 - 4,5	1 de 112,5 mg
> 4,5 - 10	1 de 250 mg
> 10 - 20	1 de 500 mg
> 20 - 40	1 de 1000 mg
> 40 -56	1 de 1400 mg

Para perros de más de 56 kg, use una combinación de dos pipetas que se ajuste al peso del animal.

Administrar cada 12 semanas.

Tiempo de retiro:

No aplica.



INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: Dimetilacetamida, Glicofurool, dietiltoluamida, acetona	Almacenamiento: Conservar a temperatura no mayor a 30°C.
Vida útil: 24 Meses	Presentación: Pipeta de una dosis con una lámina de aluminio/polipropileno, sellada con una tapa de PEAD y empacada en sobre laminado de aluminio. Cada caja de cartón contiene 1 o 2 pipetas para gatos de 0,4; 0,89; 7 1,79 mL. Pipeta de una dosis con una lámina de aluminio/polipropileno, sellada con una tapa de PEAD y empacada en sobre laminado de aluminio. Cada caja de cartón contiene 1 o 2 pipetas para perros de 0,4; 0,89; 1,79; 3,57; y 5,0 mL

TITULARIDAD

Información de contacto: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Fabricante/Titular: Intervet Inc. (Estados Unidos)/Intervet Productions (Francia)	
	Número Reg. ICA: 10422-MV	Fecha emisión: 23-Ago-2019

