

**INFORMACION GENERAL**

<b>Nombre producto:</b> Porcilis PCV ID	<b>Composición:</b> ORGANISMO MODIFICADO GENETICAMENTE
<b>Forma farmacéutica:</b> Emulsión inyectable	Cada dosis de 0.2 mL de vacuna contiene:  Antígeno de subunidad ORF2 de Circovirus porcino tipo 2 ≥ 1436 Unidades Antigénicas

**DATOS CLÍNICOS**

<b>Especies:</b> Porcinos  	<b>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:</b>  Vacunar animales sanos únicamente. Agitar bien antes de utilizar. Antes de utilizar la vacuna, permita que alcance la temperatura ambiente (15-25°C) y agite bien antes de su uso. Utilizar jeringas y agujas estériles. Evitar la introducción de contaminación. Evitar el uso de equipos de vacunación con partes de caucho. Vida útil después de abrir el recipiente por primera vez: 8 horas. Si usted es inyectado de forma accidental con este producto, busque asesoría médica oportuna incluso si una cantidad muy pequeña es inyectada y lleve el inserto del empaque con usted. Manténgase fuera del alcance de los niños. NO CONGELAR - Protéjase de la luz. Uso Veterinario.
<b>Indicaciones:</b>  En cerdos, para la inmunización activa frente a la infección con Circovirus porcino tipo 2 (PCV2), reduciendo la viremia la carga viral en órganos y tejidos linfoides, la mortalidad, la excreción del virus y la pérdida de peso ocasionada por la infección con PCV2. Uso en animales gestantes y lactantes. Uso asociado con Porcilis Lawsonia ID.	<b>Dosis/Vía de administración:</b> Administrar una dosis de 0.2 mL a cerdos de 3 semanas de edad o mayores. Vacunar a los cerdos por vía intradérmica usando un dispositivo de inyección sin aguja multi-dosis para aplicación intradérmica de líquidos adecuado para dosificar un volumen de vacuna de 0.2 mL ± 10% a través de la epidermis. Uso mixto con Porcilis Lawsonia ID: Porcilis PCV ID se puede utilizar para reconstituir el liofilizado de Porcilis Lawsonia poco antes de la vacunación en cerdos a partir de las 3 semanas de edad de la siguiente manera: Porcilis Lawsonia ID Liofilizado - Porcilis PCV ID: 50 Dosis - 10 mL 100 Dosis - 20 mL
	<b>Tiempo de retiro:</b> N/A

**INFORMACION FARMACEUTICA**

<b>Lista de excipientes:</b> (Polisorbato 80, simeticona, cloruro de sodio, cloruro de potasio, fosfato disódico dihidratado, dihidrógeno fosfato de potasio) Diluyente (Agua para inyectables) c.s.p. 2 mL Adyuvante: (Acetato de di-a-tocoferol, parafina líquida ligera)	<b>Almacenamiento:</b> Almacenar entre 2 – 8°C
<b>Vida útil:</b> 21 Meses	<b>Presentación:</b> Fracos en PET o vidrio hidrolítico tipo I por 10 mL (50 dosis) y 20 mL (100 Dosis).

**TITULARIDAD**

<b>Información de contacto/Importador:</b> MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	<b>Titular/Fabricante</b> Intervet International B.V. – Holanda
	<b>Número Reg. ICA:</b> 10160-BV
	<b>Fecha emisión:</b> 19-Abr-2018

