

# CHORULON

## PRODUCTO FARMACÉUTICO

### INFORMACION GENERAL

**Nombre producto:**

CHORULON

**Forma farmacéutica:**

Polvo para solución inyectable

**Composición:**

Una vez reconstituido, cada mL contiene:  
 Gonadotropina Coriónica 300 U.I.

### DATOS CLÍNICOS

**Especies:**

Bovinos, equinos, perros, peces


**Indicaciones:**

Para bovinos, equinos y perros en trastornos de la fertilidad de origen ovárico: celos anovulatorios, ninfomanía, cuerpo lúteo persistente. inducción y sincronización de la ovulación. Coadyuvante en la criptorquidia canina. Hembras de peces para la inducción de oviposición. Otras indicaciones a criterio del Médico Veterinario.

**Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:**

Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Antes de instaurar el tratamiento hormonal es preciso establecer un buen diagnóstico para descartar situaciones hormonales o de manejo. Venta por prescripción del Médico Veterinario.

**Dosis/Vía de administración:**

Especie	Indicaciones	Dosificación y administración
Bovino(vacas, novillas)	Mejora de la tasa de concepción Inducción de la ovulación de quistes foliculares	1500 UI IM ó IV en el momento de la IA/cubrición y/ó 6 días más tarde 3000 UI IV
Cerdas adultas y nulparas	Inducción de la ovulación	500 a 700 UI, IM 24 horas antes o en el momento de la primera IA
Hembras de peces	Inducción del desove	200 a 4000 UI/kg pv según especies, IM ó IP
Yeguas	Inducción de la ovulación (folículos $\geq$ 3,5 cm de diámetro)	1500 - 3000 UI IM ó IV, 24 horas antes de la IA ó cubrición
Perros	Inducción de la ovulación para tratar el anestro Ovulación retardada, estro prolongado	Después del pre-tratamiento con gonadotropina sérica de yegua preñada, administrar 500 UI IM ó IV el primer día del celo. 100 - 800 UI/día IM, repetir el tratamiento hasta que desaparezca el flujo vaginal

**Tiempo de retiro:**

Cero días

# CHORULON

## PRODUCTO FARMACÉUTICO

### INFORMACION FARMACÉUTICA

<b>Lista de excipientes:</b>  Manitol, fosfato disodico 2H2 O, sodio dihidrogenofosfato 2H2O	<b>Almacenamiento:</b> Almacenar a temperaturas inferiores a 25°C. Tras la reconstitución, el producto puede almacenarse de 2 a 8°C durante un máximo de 24 horas.
<b>Vida útil:</b> 36 meses	<b>Presentación:</b> Frascos que contienen 1.500 U.I. Diluyente frasco vial de vidrio tipo I.

### TITULARIDAD

<b>Titular / Información de contacto:</b> <b>MSD Salud Animal Colombia S.A.S.</b> Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	<b>Titular/Fabricante:</b> Intervet International B.V. - Holanda	
	<b>Número Reg. ICA:</b> 4338-DB	<b>Fecha emisión:</b> 30-nov-1996