


INFORMACION GENERAL

| | |
|---|---|
| Nombre producto: Nobivac Rabia | Composición: Cada dosis contiene: |
| Forma farmacéutica: Suspensión inyectable | Virus rábico cepa Pasteur RIVM. 2 UI |

DATOS CLÍNICOS

| <p>Especies: Caninos, felinos, bovinos, ovinos, equinos.</p>  | <p>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No congelar. Venta bajo fórmula del médico veterinario.</p> | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------|------------------------|----------------------------|---------------|
| <p>Indicaciones: Para la inmunización contra la rabia en perros, gatos, bovinos, ovinos y equinos sanos. Transcurridos 3 semanas después de la vacunación se alcanzan los niveles máximos de anticuerpos, seguidos por un nivel mas o menos constante, suficientemente alto para dar protección.</p> | <p>Dosis/Vía de administración: 1 mL por inyección intramuscular o subcutánea.</p> <p>Esquema de vacunación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Perros/Gatos</th> <th>Bovino/Caballos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primera vacunación a partir de</td> <td>3 meses*</td> <td>6 meses*</td> </tr> <tr> <td>Revacunaciones cada</td> <td>3 años** (1 año LA)</td> <td>2 años**</td> </tr> <tr> <td>Modo de administración</td> <td>Intramuscular o subcutanea</td> <td>Intramuscular</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Vacunar los animales a edad más temprana es posible; en este caso se necesita una revacunación a los 3 o 6 meses, dependiendo de la especie. ** El intervalo recomendado entre las vacunaciones se ha basado en los resultados de los experimentos de desafío. Las regulaciones locales en vigor pueden requerir una revacunación más temprana.</p> | | Perros/Gatos | Bovino/Caballos | Primera vacunación a partir de | 3 meses* | 6 meses* | Revacunaciones cada | 3 años** (1 año LA) | 2 años** | Modo de administración | Intramuscular o subcutanea | Intramuscular |
| | Perros/Gatos | Bovino/Caballos | | | | | | | | | | | |
| Primera vacunación a partir de | 3 meses* | 6 meses* | | | | | | | | | | | |
| Revacunaciones cada | 3 años** (1 año LA) | 2 años** | | | | | | | | | | | |
| Modo de administración | Intramuscular o subcutanea | Intramuscular | | | | | | | | | | | |
| | <p>Tiempo de retiro: No aplica.</p> | | | | | | | | | | | | |

INFORMACION FARMACEUTICA

| | |
|--|---|
| <p>Lista de excipientes: AlPO₄ 5%, Na₂HPO₄ 2H₂O, Na₂H₂PO₄ 2H₂O, medio de mantenimiento, agua purificada, timerosal (preservante).</p> | <p>Almacenamiento: Almacenar entre 2 – 8°C.</p> |
| <p>Vida útil: 48 Meses</p> | <p>Presentación: Fracos viales en vidrio tipo II por 1 y 10 dosis. Cajas con 10 frascos viales en vidrio tipo II por 1 dosis. Cajas con 10 frascos viales en vidrio tipo II por 10 dosis. Cajas con 50 frascos viales en vidrio tipo II por 1 dosis.</p> |



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia
Teléfono: 571 592 5050

Titular/Fabricante

Intervet International B.V. - Holanda

Número Reg. ICA:

4572-DB

Fecha emisión:

21-Mar-1998

