


INFORMACION GENERAL

<p>Nombre producto: Nobivac Tricat Trio</p>	<p>Composición: Cada dosis de 1 mL contiene:</p>
<p>Forma farmacéutica: Liofilizada + Diluyente</p>	<p>al menos 4,6 log₁₀ UFP de calicivirus felino, al menos 5,2 log₁₀ UFP de virus de rinotraqueítis viral felina y al menos 4,3 log₁₀ DICT₅₀ de virus de la panleucopenia felina</p>

DATOS CLÍNICOS

<p>Especies: Felinos</p> 	<p>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:</p> <p>Aplicar solamente en animales sanos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. No mezclar con otras vacunas. Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR. USO VETERINARIO. Utilizar equipo de vacunación estéril y evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectante o alcohol.</p>
<p>Indicaciones:</p> <p>Para la inmunización activa de gatos frente a rinotraqueítis felina, infecciones por calicivirus felino y el virus de la panleucopenia felina.</p> <p>La duración de la inmunidad es de 1 año para los componentes FCV y FVR y de 3 años para el componente FPLV.</p>	<p>Realizar una adecuada evaluación clínica antes de la vacunación. Ya que el producto no ha sido probado en gatas gestantes ni durante la lactancia, no se recomienda la vacunación durante la gestación.</p> <p>Dosis/Vía de administración:</p> <p>Antes de su uso, reconstituir la vacuna con el vial acompañante y permitir que la misma alcance la temperatura ambiente. El contenido de un vial de vacuna reconstituida (1 ml) debe inyectarse por vía subcutánea inmediatamente después de su reconstitución. Aplicar a partir de las 8-9 semanas de edad.</p> <p>Esquema de vacunación:</p> <p>Para el esquema de vacunación inicial, es necesario que se inyecten dos dosis subcutáneamente, con intervalo de 3-4 semanas. La primera inoculación se administra a la edad de 12 semanas.</p> <p>Tiempo de retiro:</p> <p>No aplica.</p>

INFORMACION FARMACEUTICA

<p>Lista de excipientes: Gelatina hidrolizada, sorbitol, digesto pancreático de caseína, fosfato disódico dihidratado, agua para inyección.</p>	<p>Almacenamiento: Almacenar entre 2 – 8°C.</p>
<p>Vida útil: 33 Meses</p>	<p>Presentación: Liofilizado en frasco unidosis de vidrio tipo I y 1 mL de diluyente en frasco de vidrio tipo I. Caja que contiene 5 o 25 frascos con liofilizado unidosis de vidrio tipo I y 1 mL de diluyente en frascos de vidrio tipo I.</p>



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia

Teléfono: 571 592 5050

Titular/Fabricante

Intervet International B.V. - Holanda

Número Reg. ICA:

8573-BV

Fecha emisión:

05-May-2011

