RANGER
PRODUCTO FARMACÉUTICO

MSD Salud Animal

INFORMACION GENERAL	
Nombre producto: Ranger	***Composición:*** Cada 100 mL contienen Ivermectina: 1.00 g
Forma farmaceutica: Suspensión	

DATOS CLÍNICOS

Especies:
Bovinos y porcinos.

Indicaciones:

Tratamiento y/o control de las endo y ectoparasitosis de BOVINOS:
Parásitos gastrointestinales: adultos y larvas de 4º estadio: *Ostertagia ostertagi, Osteratgia lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus helvetianus* (adulto), *Nematodirus spathiger* (adulto), *Strongyloides papillosus* (adulto).
Parásitos pulmonares: adultos y larvas de 4º estadio: *Dictyocaulus viviparus.*
Ectoparásitos garrapatas: *Rhipicephalus microplus.*
Nuche: Larvas de *Dermatobia hominis, Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum.*
Piojos: *Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis*.
Acaros: *Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var, bovis, Chorioptes bovis.*

PORCINOS:
Parásitos gastrointestinales: *Strongyloides ransomi* (adulto), *Hyostrongylus rubidus, Ascaris suum, Trichuris suis* (adulto).
Parásitos pulmonares: adultos y larvas de 4º estadio: *Metastrongylus spp*. (adulto).
Parásitos renales: *Stephanurus dentatus.*
Ácaros: *Sarcoptes scabiei var suis*.

BOVINOS Y PORCINOS:
Larvas de *Cochliomyia hominivorax* (Ayuda en el control de estos parásitos cuando es usado como parte de un programa continuo.

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:

Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No se debe guardar o aplicar junto a alimentos, bebidas, productos de higiene y domésticos. Se debe usar guantes de goma durante la aplicación. Evitar el contacto con la piel; si ocurre, se debe lavar el sitio afectado. Lavar las manos después de manipular el producto. Volúmenes superiores a 5 mL deben ser fraccionados en más de un sitio de aplicación. Conservar a una temperatura menor a 30°C al abrigo de la luz. Venta bajo fórmula del médico veterinario.

Dosis/Vía de administración:

BOVINOS: Debe ser administrado exclusivamente por vía subcutánea, bajo la piel suelta, en la parte frontal o posterior de la escápula, en dosis de 200 mcg/Kg de peso (1 mL para 50 Kg de peso corporal).
PORCINOS: Debe ser administrado exclusivamente por vía subcutánea, en el cuello, en dosis de 300 mcg/Kg de peso (1 mL para 33 Kg de peso corporal).

Tiempo de retiro:
Los bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 35 días después de finalizado el tratamiento. Los porcinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 18 días después de finalizado el mismo. No debe ser administrado en hembras lecheras en el periodo de lactación.

INFORMACION FARMACEUTICA	
Lista de excipientes: Metiletilacetona, glicerol formal, propilenglicol.	***Almacenamiento:*** Conservar a una temperatura menor a 30°C, al abrigo de la luz.
Vida útil: 36 Meses	***Presentación:*** Frasco plástico en polipropileno por 50 o 500 mL.

TITULARIDAD		
Información de contacto/Importador: **MSD Salud Animal Colombia S.A.S.** Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	***Titular/Fabricante:*** Vallée S.A. - Brasil	
	Número Reg. ICA: 6835-MV	***Fecha emisión:*** 18-Ago-2005