

Composición:

Cada 100 mL de Suspensión Inyectable contiene:

Hierro Dextrán (10% p/v de Hierro)	Aporta 1,11111% p/v de Hierro	11,1111 mL
Cloruro de Cobre dihidratado	Aporta 0,00165% p/v de Cobre	0,00444 g
Glutamato de Sodio monobásico monohidratado (L)	Aporta 0,81245% p/v de Glutamato	1,03333 g
Clorhidrato de Arginina (L)	Aporta 0,46857% p/v de Arginina	0,56667 g
Clorhidrato de Lisina (L)	Aporta 0,88931% p/v de Lisina	1,11111 g
Treonina (L)		0,55556 g
Valina (L)		0,46667 g
Nicotinamida (Vitamina B3)		1,66667 g
Cloruro de Colina (Vitamina B8)	Aporta 1,65788% p/v de Colina	2,22222g
Excipientes c.s.p.		100 mL

Especies:

Bovinos y Porcinos



Posología y Modo de uso:

Bovinos: Terneros: Administrar 5 mL por vía subcutánea

Adultos: Administrar 10 mL por vía subcutánea. Una sola dosis

Porcinos: Lechones: Administrar 2 mL por las vías subcutánea o intramuscular.

Adultos: Administrar 5 mL por vía intramuscular. Una sola dosis.

Nota: hembras gestantes, machos reproductores y animales jóvenes pueden ser tratados normalmente.

Cambios en la posología y modo de usar a criterio del Médico Veterinario.

Indicaciones:

En bovinos y porcinos en diferentes fases del desarrollo, como Suplemento de Vitaminas, Aminoácidos y Sales Minerales en las deficiencias nutricionales, coadyuvante en el tratamiento de animales debilitados, reconstituyente y vigorizante orgánico.

Precauciones:

AGITAR ANTES DE USAR

- Utilizar jeringas y agujas estériles
- Tras la apertura, el producto debe ser utilizado hasta 21 días, desde que se mantengan las condiciones de asepsia y conservación. Tras este periodo, los eventuales sobrantes deben ser descartados de acuerdo con la normativa ambiental local vigente.
- No utilizar los materiales de envases vacíos.
- Las personas con hipersensibilidad conocida al hierro dextrano deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.
- No administrar juntamente con preparados de hierro por vía oral.
- No utilizar el producto tras el vencimiento

Contraindicaciones:

No utilizar en animales con:

- Historial conocido de hipersensibilidad al hierro dextrano o algún excipiente
- Anemias de tipo infeccioso
- Deficiencias de vitamina E y/o Selenio (puede ocasionar la muerte)
- Patologías hepáticas o renales
- Diarrea colibacilar (puede ocasionar la muerte)

Tiempo de retiro:

N/A

Almacenamiento:

Conservar a menos de 30°C. Mantener al abrigo de la luz

Vida útil:

24 Meses

Después de abrir: 21 días

Presentación:

Frasco por 90mL, 100mL, 225mL, 250mL, 450mL y 500 mL.

Fabricante: Vallée S.A. - Brasil

Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Reg. ICA No.

10962-MV

Fecha emisión:

28-DIC-2021

