

## FICHA TÉCNICA

### BOVILIS® POLISTAR +T

Registro ICA No. 8940-BV

#### USO VETERINARIO

1

#### Vacuna Polivalente contra Clostridiosis

##### COMPOSICIÓN:

Cada mL de bacterina-toxoide contiene:

<i>Clostridium novyi</i> Tipo B	≥ 0.5 UI
<i>Clostridium tetani</i>	≥ 2.5 UI
<i>Clostridium sordellii</i>	≥ 1.0 UI
<i>Clostridium septicum</i>	≥ 2.5 UI
<i>Clostridium perfringens</i> Tipo C	≥ 10.0 UI
<i>Clostridium perfringens</i> Tipo D	≥ 2.0 UI
<i>Clostridium botulinum</i> Tipo C	≥ 5.0 UI
<i>Clostridium botulinum</i> Tipo D	≥ 2.0 UI
Anacultivo <i>C. chauvoei</i> (aprobado potencia)	≥ 0.125 UI
Excipientes c.s.p.	1 mL



##### INDICACIONES:

Para la inmunización activa de bovinos, ovinos y caprinos contra: Mancha (Carbunco sintomático), Edema maligno (Gangrena gaseosa), Disentería de los corderos, Hepatitis infecciosa necrosante, Gastritis hemorrágica por *C. septicum* (Braxy), Síndrome de Muerte Súbita, Enfermedad del Riñón Pulposo, Enterotoxemia, Tétano y Botulismo.

##### ESPECIE DESTINO:

Bovinos, Ovinos, Caprinos

##### FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable

##### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicar por vía subcutánea, con la siguiente dosis:

Bovinos: 5 mL

Ovinos, Caprinos: 3 mL

En animales que nunca fueron inmunizados, administrar dos dosis separadas por un intervalo de 4 semanas. Revacunar anualmente o a criterio del médico veterinario.

Se pueden vacunar animales a partir de los 2 meses de edad, para los cuales se recomienda revacunar a los 6 meses de edad, y luego anualmente o a criterio del médico veterinario.

El programa vacunal es variable en función del manejo de los animales y del riesgo de exposición al agente en el ambiente, por lo tanto debe establecerse de acuerdo con la orientación del médico veterinario.

**PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:**

Agitar bien antes de usar.

Pueden ocurrir ocasionalmente reacciones de hipersensibilidad. En esos casos, un tratamiento con antihistamínicos debe ser administrado sin demora.

No vacunar animales enfermos o estresados.

Utilizar agujas y jeringas estériles.

Debido a la especial susceptibilidad de los caprinos, se recomienda consultar al médico veterinario antes de proceder a la vacunación.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**ALMACENAMIENTO:**

Conservar entre 2°C a 8°C, protegido de la luz solar.

**PRESENTACIÓN COMERCIAL:**

Frascos por 100 mL (20 dosis) y 250 mL (50 dosis)

**FABRICADO POR:**

Laboratorio PRONDIL S.A.

Uruguay

**IMPORTADO POR:**

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia