



## FICHA TÉCNICA

### ALBIPEN L.A.

Registro ICA No. 4037-DB

USO VETERINARIO

#### COMPOSICIÓN:

Cada mL de suspensión oleosa contiene:

Ampicilina Anhidra

100 mg

Excipientes c.s.p.

1 mL



#### INDICACIONES:

En bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, perros y gatos para el tratamiento de las infecciones ocasionadas por: *Arcanobacterium sp.*, *Diplococcus pneumoniae*, *Escherichia coli*, *Haemophilus sp.*, *Pasteurella sp.*, *Proteus sp.*, *Salmonella typhimurium*, *Staphylococcus sp.* y *Streptococcus sp.*

#### ESPECIE DESTINO:

Bovinos, Caninos, Caprinos, Felinos, Ovinos y Porcinos.

#### FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

La dosis depende de la edad y del peso, siendo generalmente de 15 mg/kg de peso vivo para animales adultos y de 25 mg/Kg peso vivo para animales jóvenes.

Se administra por vía parenteral, preferiblemente por vía subcutánea en pequeños animales y por vía intramuscular en grandes animales.

Se puede repetir la aplicación a las 48-72 horas.

#### **Bovinos, porcinos, ovinos y caprinos:**

3 mL por cada 20 kg de peso, administrando 15 mg/kg de ampicilina.

#### **Perros y gatos:**

2 mL por cada 10 kg de peso, administrando 20 mg/kg de ampicilina.

#### PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:

Albipen L.A. no debe administrarse en animales con alergia conocida a penicilina.

Albipen L.A. está contraindicado en pequeños roedores.

Albipen L.A. no debe utilizarse si se sabe que están presentes estafilococos productores de  $\beta$ -lactamasas.



2

**TIEMPO DE RETIRO:**

Los bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

Los porcinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 24 días después de finalizado el tratamiento.

**ALMACENAMIENTO:**

Almacenar entre 15°C - 25°C

No congelar

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

Agitar bien antes de su uso.

Como las suspensiones oleosas pueden bloquear la aguja en presencia de agua, únicamente deben utilizarse jeringas perfectamente secas.

**ADVERTENCIAS:**

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

**PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Frasco por 80 mL

**FABRICADO POR**

Intervet Productions S.r.l.

Italia

**IMPORTADO POR**

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia