

FICHA TÉCNICA

BYKAHEPAR®

Registro ICA No. 1836-DB

USO VETERINARIO



1

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene:

Clanobutino de sodio

106,4 mg

Excipientes c.s.p

1 mL

INDICACIONES

Bovinos, ovinos y caprinos de cualquier edad: Acidosis ruminal, alcalosis ruminal, timpanismo, obstrucción intestinal, constipación de origen nutricional.

Equinos, porcinos y perros: Coprostasis, atonía intestinal, disfunción hepatopancreática, íleo postoperatorio.

ESPECIE DESTINO

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La dosis diaria se establece entre 10-20 mg/kg de peso (1-2 mL/10kg), pudiendo repetirse en casos graves la mitad de la dosis a las 12 horas.

La vía de administración en bovinos, ovinos y caprinos es intravenosa o intramuscular; en equinos, intravenosa; en porcinos, intramuscular o subcutánea y, en perros, intramuscular.

Se recomienda no inyectar por vía intramuscular más de 20 mL en un mismo sitio de aplicación.

La administración intravenosa debe hacerse lentamente (en un tiempo no inferior a un minuto).

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con pancreatitis aguda y/o con obstrucción de las vías biliares.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 168 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

ALMACENAMIENTO

Consérvese por debajo de 30°C



INFORMACIÓN ADICIONAL

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 50 mL y 100mL.

FABRICADO POR:
TRIRX SEGRE
Francia

IMPORTADO POR:
MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia

2