

FICHA TÉCNICA

MASTIPLAN® LC

Registro ICA No. 9752-MV
USO VETERINARIO

1

COMPOSICIÓN

Cada jeringa de 8 gramos contiene:

Cefapirina base (como Cefapirina sódica 316 mg)	300 mg
Prednisolona	20 mg
Excipientes c.s.p	8 g



INDICACIONES

Tratamiento de mastitis clínica en vacas lecheras en lactancia causadas por *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus coagulasa* negativos, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis* y *Escherichia coli*, sensibles a cefapirina.

ESPECIE DESTINO

Bovinos

FORMA FARMACÉUTICA

Suspension intramamaria

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

El contenido de una jeringa debe ser administrado dentro de cada cuarto afectado vía el canal del pezón, inmediatamente después de lo ordeña, con 12 horas de intervalo, por cuatro ordeñas consecutivas.

Antes de la administración, la ubre debe ser ordeñada completamente. El pezón y su orificio deben ser completamente limpiados y desinfectados con una toalla de limpieza que viene con cada jeringa.

(A). Evitar la contaminación de la boquilla de lo jeringa. Retirar la parte superior de lo tapa y suavemente insertar alrededor de 5 mm **(B)** o remover toda la tapa e insertar la longitud total de la boquilla **(C)** en el canal del pezón. Administrar todo el contenido de la jeringa al interior del cuarto.

Dispersar el producto masajeando suavemente el pezón y la ubre de la vaca afectada.





PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

No usar las toallas de limpieza sobre pezones con heridas abiertas.

El uso del producto debe estar basado en pruebas de susceptibilidad, tomando en cuenta las políticas oficiales y locales para antimicrobianos.

La jeringa solo debe ser usada una vez por pezón.

Penicilinas y cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad (alergia) después de la inyección, inhalación, ingestión o contacto con la piel. La hipersensibilidad a penicilinas puede llevar a una sensibilidad cruzada a cefalosporinas y viceversa. Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser ocasionalmente severas.

Precauciones para el operador

No manejar este producto si se conoce que se es sensible a penicilinas o cefalosporinas o si ha sido advertido de no trabajar con estas preparaciones.

Manejar este producto con cuidado para evitar la exposición, tomar todas las precauciones recomendadas. Si se desarrollan síntomas después de la exposición, tales como erupción cutánea, debe buscar asistencia médica y mostrarle al médico la advertencia. La inflamación de la cara, labios u ojos o dificultad para respirar son los síntomas más serios y requieren atención médica de urgencia.

Lavarse los manos usando toallas limpias y si la irritación de la piel debido a isopropil alcohol es conocida o sospechada utilizar guantes de protección.

Uso durante la preñez y lactancia:

Mastiplan[®] LC pueden ser usados en vacas durante la lactación y preñez y en animales reproductores. Los estudios de laboratorio en ratones, ratas, conejos, y hámster no han producido ninguna evidencia de efectos teratogénicos, fetotóxicos y materno tóxicos.

No hay evidencia de toxicidad reproductiva (incluyendo teratogénesis) en bovinos.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 4 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 132 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

ALMACENAMIENTO

Mantener entre 15 °C y 30 °C.

Guardar las jeringas en su caja original.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos



PRESENTACIÓN COMERCIAL

Jeringa por 8 g.

Caja por 20 jeringas por 8 g y 20 toallas de limpieza.

FABRICADO POR

Intervet International B.V.

Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia