

FICHA TÉCNICA

NAQUASONE®

Registro ICA No. 2123-DB

USO VETERINARIO



COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene:

| | |
|--------------------|--------|
| Dexametasona | 0,5 mg |
| Triclorometiazida | 10 mg |
| Excipientes c.s.p. | 1 mL |

INDICACIONES

En ganado bovino para el tratamiento de edema fisiológico de la glándula mamaria y estructuras asociadas durante el post-parto.

En bovinos y en equinos en afecciones edematosas inflamatorias y no inflamatorias.

ESPECIE DESTINO

Bovinos y Equinos

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos: Antes, durante o inmediatamente después del parto, inyectar 20 mL por vía intramuscular.

Equinos: En cualquier etapa. Maneje una dosis de 0.5 mL/45 kg. Administre 2 veces el primer día y una sola dosis del producto, por los próximos 2 días siguientes.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

La duración total del tratamiento no debe exceder de 3 días. No debe administrarse en el último tercio de gestación.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

ALMACENAMIENTO

Consérvese entre 2 °C y 30 °C



ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

2

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 5mL, 10mL, 20mL, 100mL y 200 mL

FABRICADO POR

Trirx Segre

Francia

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia