



FICHA TÉCNICA

NOBILIS® RT inac

Registro ICA No. 5647-DB

USO VETERINARIO

1

DESCRIPCIÓN

Vacuna inactivada para la protección de pavos y pollos frente a la enfermedad causada por el virus de la Rinotraqueítis Aviar

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 0.5 mL contiene:

Virus TRT inactivado (Neumovirus)

≥ 50 EU

Excipientes c.s.p.

1 dosis

INDICACIONES

Inmunización activa de pollos de cría y gallinas ponedoras, y pavos de cría, para reducir la mortalidad y los signos clínicos (incluido la caída de la producción de huevos) inducidos por la infección por el virus de la Rinotraqueítis Aviar.

ESPECIE DESTINO

Aves

FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión oleosa

DOSIS, VÍA y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Administrar 0,5 mL/ave por vía intramuscular en el muslo, en la pechuga o por vía subcutánea en la parte baja del cuello.

Programa de vacunación

Nobilis® RT inac debe administrarse a pavos de aproximadamente 28 semanas de vida.

Los pollos deberán ser vacunados aproximadamente a las 12-20 semanas de vida.

En ningún caso se administrará la vacuna menos de 4 semanas antes del inicio del periodo de postura.

Para un efecto de revacunación óptima, las aves deben primovacunarse con la vacuna viva frente a la Rinotraqueítis Aviar.

Los mejores resultados se obtienen cuando la vacunación se realiza al menos 4 semanas después de administrar la primovacunación con virus vivo.

**Inmunización y reacción vacunal**

Si la vacunación y la primovacuna se han realizado correctamente, las aves desarrollarán niveles altos de anticuerpos frente a Rinotraqueítis Aviar.

Durante algunas semanas después de la vacunación puede notarse una ligera inflamación en el lugar de la inoculación. Ello no constituye un daño permanente del tejido, siempre y cuando la vacunación se halla llevado a cabo de forma aséptica.

PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Vacunar solamente aves sanas.

Antes de comenzar la vacunación, dejar que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15°C - 25°C)

Agitar antes y durante el empleo.

Utilizar un equipo de vacunación estéril.

No mezclar Nobilis® RT inac con otras vacunas.

En caso de inyección accidental a una persona, puede producirse con una reacción local. Conviene consultar al médico inmediatamente, informándole que la vacuna es una emulsión de aceite.

No utilice un equipo de vacunación con componentes de goma, ya que el excipiente de la vacuna podría dañarla

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

La disposición de frascos y todo contenido sobrante debe realizarse acorde con la legislación local.

TIEMPO DE RETIRO

Cero días

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2°C y 8°C

Proteger de la luz. No congelar.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 500 mL (1000 dosis)

FABRICADO POR

Intervet International B.V.

Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia