



## FICHA TÉCNICA

### NOBIVAC® KC

Registro ICA No.5325-DB  
USO VETERINARIO



### COMPOSICIÓN

Cada dosis de 0,4 mL contiene:

Virus de Parainfluenza Caninam Cepa Cornell  
*Bordetella bronchiseptica*. Cepa BC2  
Excipientes c.s.p.

$\geq 10^3$  TCID<sub>50</sub>  
 $\geq 10^8$  UFC  
0.4 mL

### INDICACIONES

Vacuna para desarrollar la inmunidad activa contra la Tos de las perreras provocada por *Bordetella Bronchiseptica* y el virus de la Parainfluenza Canina.

### ESPECIE DESTINO

Perros

### FORMA FARMACÉUTICA

Liofilizado para reconstituir

### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Reconstituir la vacuna con el diluyente adjunto.  
Remover el agua y conectar al aplicador.  
Administrar 0.4 mL en un orificio nasal.

La vacuna se puede aplicar desde las dos semanas de edad.

En caso de alta exposición y antecedentes del criadero, se puede aplicar una dosis 72 horas antes del periodo de riesgo.

Revacunar anualmente.

### ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

### ALMACENAMIENTO

Conservar entre 2°C - 8°C



**PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Frasco unidosis. Caja por 5, 10 y 25 dosis.

**FABRICADO POR**

Intervet International B.V  
Países Bajos

**IMPORTADO POR**

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.  
Bogotá, Colombia

2