

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® RABIA

Registro ICA No.4572-DB
USO VETERINARIO

1

DESCRIPCIÓN

Vacuna contra la rabia en bovinos, equinos, ovinos, perros y gatos. Nobivac® Rabia contiene un cultivo del virus de la Rabia, clonado de la cepa Pasteur RIVM. El virus es cultivado en la línea de la célula BHK-21 clone CT e inactivado por β -propiolactona. Es presentado en una suspensión acuosa de fosfato de aluminio.



COMPOSICIÓN

Cada mL (1 dosis) de suspensión inyectable contiene:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Virus Rábico cepa Pasteur RIVM | ≥ 2 UI |
| Excipientes c.s.p. | 1 dosis |

INDICACIONES

Para la inmunización activa contra la rabia en Bovinos, Equinos, Ovinos, Perros y Gatos. En principio, todos los mamíferos sanos.

Transcurridas 3 semanas después de la vacunación se alcanzan los niveles máximos de anticuerpos, seguidos por un nivel más o menos constante, suficientemente alto para dar protección.

ESPECIES DESTINO

Perros, Gatos, Bovinos, Ovinos, Equinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspension Inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

1 mL por inyección intramuscular o subcutánea.

| | Perros/Gatos | Bovinos/Caballos |
|--------------------------------|----------------------------|------------------|
| Primera vacunación a partir de | 3 meses* | 6 meses* |
| Revacunaciones cada | 3 años** (1 año LA) | 2 años** |
| Modo de administración | Intramuscular o subcutánea | Intramuscular |

* Vacunar los animales a edad más temprana es posible; en este caso, se necesita una revacunación a los 3 o 6 meses, dependiendo de la especie.

** El intervalo recomendado entre las vacunaciones se ha basado en los resultados de los experimentos de desafío. Las regulaciones locales en vigor pueden requerir una revacunación más temprana.



PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Agitar bien antes de usar

Reacciones vacunales

Ocasionalmente puede producirse un nódulo palpable transitorio en el lugar de la inoculación después de la administración subcutánea.

ALMACENAMIENTO

Conservar entre 2°C y 8° C.

No congelar. Protéjase de la luz y de los rayos directos del sol.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frascos por 1 y 10 dosis. Caja por 10 y 50 frascos de 1 dosis.

FABRICADO POR

Intervet International B.V.
Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia