

## FICHA TÉCNICA

### PANACUR® FT

Registro ICA No. 10762-MV  
USO VETERINARIO



### COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución oral contienen:

Toltrazuril	7.5 g
Fenbendazol	2.5 g
Excipientes c.s.p	100 mL

### INDICACIONES:

En terneros para el tratamiento y control de eimeriosis, causada por las principales especies de eimeria: *E. bovis* y *E. zuernii*, *E. alabamensis*, *E. canadensis*, *E. ellipsoidalis*, *E. bukidnonensis*, *E. subspherica*, *E. pellita*, *E. brasiliensis*, *E. cylindrica*, *E. wyomingensis* y *E. auburnensis*.

Tratamiento y control de los principales nematodos gastrointestinales, tales como: *Haemonchus placei* (adulto y L4) *Cooperia pectinata*, *Cooperia Spatulata*, *Trichostrongylus axei*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichuris discolor* y *Cooperia punctata*.

### ESPECIE DESTINO

Bovinos

### FORMA FARMACÉUTICA

Suspension Oral.

### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Agitas antes de usar.

Administrar en terneros, por vía oral en una sola administración, una dosis de 2 mL por cada 10 Kg de peso corporal equivalente a 150 mg de Toltrazuril por 10 kg de peso corporal y 50 mg de Fenbendazol por 10 Kg de peso corporal.

### PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Solo administrar el producto usando la ruta recomendada.

No reutilizar el envase vacío.

Cualquier producto veterinario no utilizado o cualquier material residual derivado de dicho producto debe ser eliminado de acuerdo con los requisitos locales.

El producto no debe entrar en contacto con los cursos de agua, ya que puede ser toxico para los peces y otros organismos acuáticos.

Después de abrir, el producto debe usarse dentro de un período máximo de noventa (90) días.



### **TIEMPO DE RETIRO**

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 78 días después de finalizado el tratamiento.

No usar en bovinos cuya leche se destine al consumo humano.

2

### **ALMACENAMIENTO**

Almacenar entre 15 °C y 30 °C, protegido de la luz.

### **ADVERTENCIAS**

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

### **PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Frasco por 25 mL y 1 L

### **FABRICADO POR**

Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda.  
Brasil

### **IMPORTADO POR**

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.  
Bogotá, Colombia