

FICHA TÉCNICA

PORCILIS® COLICLOS

Registro ICA No. 9363-BV

USO VETERINARIO

Organismo Genéticamente Modificado

1

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 2 mL contiene:

Adhesina fimbrial F4 ab de <i>E. coli</i>	≥ 9,3 log ₂ título Ac
Adhesina fimbrial F4 ac de <i>E. coli</i>	≥ 6,5 log ₂ título Ac
Adhesina fimbrial F5 de <i>E. coli</i>	≥ 7,5 log ₂ título Ac
Adhesina fimbrial F6 de <i>E. coli</i>	≥ 7,4 log ₂ título Ac
Toxoide LT de <i>E. Coli</i>	≥ 10,5 log ₂ título Ac
Antígeno <i>Clostridium perfringens</i> Tipo C	≥ 20 UI
Excipientes c.s.p.	2 mL



INDICACIONES

Inmunización pasiva de la progenie por inmunización activa de cerdas multíparas y primerizas para reducir la mortalidad y signos clínicos causados por cepas de *E. coli* que expresan las adhesinas F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99), F6 (987P) y/o producen LT y/o causados por el *C. perfringens* Tipo C.

Un efecto benéfico contra la infección causada por *C. perfringens* Tipo A es observado bajo condiciones de campo.

ESPECIE DESTINO

Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión Inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Inyección intramuscular en cerdas multíparas y primerizas de 1 dosis (2 mL) de la vacuna en el cuello en el área detrás del oído.

Esquema de vacunación:

Vacunación básica: a las cerdas multíparas/primerizas que aún no han sido vacunadas con el producto, se les administra una inyección primaria 6 a 8 semanas antes de la fecha esperada de parto y una inyección de refuerzo 4 semanas después.

Revacunación:

Una revacunación única es realizada 2 a 4 semanas antes de la fecha de parto esperada.



TIEMPO DE RETIRO

No aplica

ALMACENAMIENTO

Conservar entre 2°C -8°C

No congelar. Proteger de la luz

Vida útil después de usar por primera vez: 10 horas

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Agite vigorosamente antes de utilizar y en intervalos durante su uso.

Evite la introducción de contaminación

Vacunar animales sanos únicamente

Puede utilizarse durante la preñez.

No mezclar con cualquier otro producto medicinal veterinario.

No hay información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con cualquier otro producto medicinal veterinario. Por lo tanto, la decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier producto medicinal veterinario debe hacerse en una base de caso por caso.

En caso de autoinyección accidental, busque atención médica de inmediato y muéstrela al médico el inserto del empaque.

Reacciones Adversas

Después de la vacunación puede ocurrir un aumento transitorio de la temperatura corporal y una inflamación transitoria en el sitio de la inyección.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frascos viales por 20 mL (10 dosis), 50 mL (25 dosis), 100 mL (50 dosis), 200 mL (100 dosis) y 250 mL (125 dosis)

FABRICADO POR

Intervet Internatinal B.V.

Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia