



FICHA TÉCNICA

PORCILIS® GLÄSSER

Registro ICA No. 8646-BV
USO VETERINARIO

1

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 2 mL contiene:

| | |
|---|--------|
| <i>Glässerella parasuis</i> (antes <i>Haemophilus parasuis</i>) serotipo 5, cepa 4800 (≥ 0.05 mg Nitrógeno Total) | 200 mg |
| Excipientes c.s.p Adyuvante con dl- α -tocoferol | 2 mL |

INDICACIONES

Inmunización activa de cerdos de engorda para la protección frente a los signos clínicos de la enfermedad de Glässer causada por *Glaesserella parasuis* (antes *Haemophilus parasuis*) serotipo 5, y síntomas clínicos y mortalidad causada por *Haemophilus parasuis* serotipo 4.

ESPECIE DESTINO

Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Inyección intramuscular de 2 mL en el cuello del cerdo.

Se recomienda inyectar la vacuna detrás del pabellón auricular del animal.

Procedimiento de vacunación

Vacune a cerdos de 5 semanas de edad en adelante; administre la vacuna dos veces, separadas entre sí dos semanas.

En hembras gestantes: de 6 a 8 semanas antes del parto la primera dosis, y la segunda dosis de 2 a 4 semanas antes del parto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Agite el frasco antes de administrarla.

Utilice un equipo de vacunación estéril.

No administrar junto con otros medicamentos.

Tiempo de conservación una vez abierto: 3 horas.



Efectos Secundarios

Durante las horas siguientes a la vacunación puede observarse un ligero aumento de la temperatura unido a signos de malestar general.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

2

En caso de auto inyección o ingestión accidental, acuda al médico de inmediato y muéstrelle al prospecto o la etiqueta del producto.

Todo el producto no utilizado y los residuos deben eliminarse de conformidad con la normativa vigente.

TIEMPO DE RETIRO

Ninguno

ALMACENAMIENTO

Conservar entre 2°C y 8°C.

No congelar.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 20 mL (10 dosis), 50 mL (25 dosis) y 100 mL (50 dosis)

FABRICADO POR

Intervet International B.V.

Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia