



FICHA TÉCNICA

PROCYON® DAPPv +L4

Registro ICA No. 9128-BV

USO VETERINARIO



DESCRIPCIÓN

Vacuna a virus vivo modificado contra Distemper Canino - Adenovirus Tipo 2 - Parainfluenza - Parvovirus.

Bacterina de *Leptospira interrogans* serovares Canicola, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagie, Pomona.

COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene:

Fración liofilizada

Virus vivo modificado CDV, cepa Distemperoid	$\geq 10^{3.7}$ TCID ₅₀
Virus vivo modificado CAV-2, cepa Ditchfield	$\geq 10^{4.8}$ TCID ₅₀
Virus vivo modificado CPI, cepa CPI-PR	$\geq 10^{4.3}$ TCID ₅₀
Virus vivo modificado CPV, cepa SAH-CPV-2b	$\geq 10^{5.1}$ FAID ₅₀

Fración líquida

<i>Leptospira interrogans</i> serovar Canicola, cepa LC-NY	≥ 80 hámster PD 80
<i>Leptospira interrogans</i> serovar Icterohaemorrhagiae, cepa LI-11403J	≥ 80 hámster PD 80
<i>Leptospira interrogans</i> serovar Pomona	≥ 80 hámster PD 80
<i>Leptospira interrogans</i> serovar Grippotyphosa	≥ 80 hámster PD 80
Excipientes c.s.p.	1 dosis

INDICACIONES

La fracción Procyon® DHPP está indicada para la vacunación de perros sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad causada por el virus del Distemper canino (Moquillo), Adenovirus canino Tipo 1 (Hepatitis), virus de Parainfluenza canina y Parvovirus canino.

La bacterina Procyon® L4 está indicada para la vacunación de perros sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad y mortalidad causadas por *Leptospira interrogans* serovar Canicola, Icteroaemorrhagiae, Pomona y Hryppotyphosa, la prevención de la leptospiuria (eliminación de *Leptospira* en la orina) provocada por *L. Canicola*, *L. Icterohaemorrhagiae* y *L. Gryppotyphosa*, y como ayuda a la prevención de la leptospiuria causada por *L. Pomona*.

ESPECIE DESTINO

Perros

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Agite el vial de Procyon[®] L4 y transfiera su contenido al vial de Procyon[®] DAPPv asépticamente. Agite ligeramente hasta que se disuelva. Utilice el contenido completo inmediatamente después de la rehidratación. Inyecte una dosis (1 mL) por vía subcutánea.

2

La dosis inicial puede administrarse a partir de las 8 semanas de edad. Repita a intervalos de 2 a 4 semanas hasta que el perro tenga 12 semanas de edad. Se requiere un mínimo de dos dosis para la inmunización primaria. Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Según los datos obtenidos, el desarrollo de la opacidad corneal no está asociada con el uso de este producto.

Utilizar agujas y jeringas nuevas, no esterilizadas químicamente.
No mezclar con otras vacunas.
Vacunar únicamente perros sanos y desparasitados.
No vacunar a perras gestantes.
Contiene gentamicina y Anfotericina B como conservante.

La utilización de un producto biológico puede producir anafilaxia y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad inmunitaria.

Antídoto: La epinefrina, los corticosteroides y antihistamínicos pueden estar indicados, dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

La edad en la cual los anticuerpos maternos para el Parvovirus canino dejan de interferir con el desarrollo de la inmunidad activa varía según el título y la cantidad de anticuerpos en el calostro de la perra absorbidos por el cachorro.

Consulte al Médico Veterinario
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2°C a 7°C.
No congelar.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Estuche de 25 frascos de vacuna por 1 dosis.

FABRICADO POR

Intervet Inc.
Estados Unidos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia