



FICHA TÉCNICA

STIMOVIT® MOV

Registro ICA No. 10962-MV
USO VETERINARIO

1

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml de suspensión inyectable contienen:

Hierro Dextrán (10% p/V de Hierro) (aporta 1, 11111 % p/V de Hierro elemental)	11,11111 mL
Cloruro de Cobre Dihidratado (aporta 0,00165% p/N de Cobre)	0,00444 g
Glutamato de Sodio Monobásico Monohidratado (L) (aporta 0,81245% p/V de Glutamato)	1,03333 g
Clorhidrato de Arginina-L (aporta a 0,46857% p/V de Arginina)	0,56667 g
Clorhidrato de Lisina (aporta a 0,88931 % p/V de Lisina)	1,11111 g
Treonina-L	0,55556 g
Valina-L	0,46667 g
Nicotinamida (Vitamina B3)	1,66667g
Cloruro de Colina (Vitamina B8) (aporta a 1,65788% p/V de Colina)	2,22222 g
Excipientes c.s.p	100 mL

INDICACIONES

En bovinos y porcinos en diferentes fases de desarrollo, como suplemento de vitaminas, aminoácidos y sales minerales en las deficiencias nutricionales, coadyuvante en el tratamiento de animales debilitados, reconstituyente y vigorizante orgánico.

ESPECIE DESTINO

Bovinos y Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos:

Terneros: Administrar 5 mL por vía subcutánea.

Adultos: Administrar 1 o mL por vía subcutánea. Una sola dosis.

**Porcinos:**

Lechones: Administrar 2 mL por las vías subcutánea o intramuscular.

Adultos: Administrar 5 mL por vía intramuscular. Una sola dosis.

Nota: hembras gestantes, machos reproductores y animales jóvenes pueden ser tratados normalmente.

2

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Agitar antes de usar.

Utilizar jeringas y agujas estériles.

Tras la apertura, el producto debe ser utilizado hasta 21 días, desde que se mantengan las condiciones de asepsia y conservación. Tras este período, los eventuales sobrantes deben ser descartados.

No utilizar los materiales de envases vacíos.

No administrar juntamente con preparados de hierro por vía oral.

No utilizar el producto tras el vencimiento.

No usar en animales con:

Historial conocido de hipersensibilidad al hierro dextrano o algún excipiente.

Deficiencias de vitamina E y/o selenio (puede ocasionar la muerte).

Patologías hepáticas o renales.

Diarrea colibacilar

TIEMPO DE RETIRO

No tiene tiempo de retiro en carne y/o leche.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a menos de 30 °C

ADVERTENCIAS

Las personas con hipersensibilidad conocida al hierro dextrano deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Consulte al Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 90 mL, 100 mL, 225 mL, 250 mL, 450 mL o 500 mL

FABRICADO POR

Vallée S.A.

Brasil

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia